

**Indikator  
SR3\_08\_L**

**Die häufigsten Screening-Befunde bei der SR3,  
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2014/2015-2019/2020 (kumuliert)**

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		25.851	26.143	51.994
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Beeinträchtigung der Sehschärfe <sup>1,2</sup>	11,1	8,9	10,0
2	Allergie	4,0	6,3	5,2
3	Schädigung des Halte- und Stützapparates	5,4	4,4	4,9
4	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	2,4	2,9	2,7
5	Asthma bronchiale	1,8	3,4	2,6
6	Neurodermitis	2,6	2,4	2,5
7	Beeinträchtigung des Hörvermögens <sup>2</sup>	1,9	1,9	1,9
8	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,4	3,4	1,9
9	Strabismus (Schielen)	0,9	0,8	0,9
10	Bronchitisches Syndrom	0,4	0,7	0,5

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

<sup>1</sup> Brillenträger oder keine Brille aber handlungsbedürftige  
Visusminderung

<sup>2</sup> ab 2015 geänderte Grenzwerte bei Visus- und Hörtest

Indikator  
SR3\_08\_L

Die häufigsten Screening-Befunde bei der SR3,  
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2019/2020\*

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		3.482	3.499	6.981
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Beeinträchtigung der Sehschärfe <sup>1,2</sup>	11,7	8,8	10,2
2	Allergie	3,9	5,6	4,7
3	Schädigung des Halte- und Stützapparates	4,7	2,9	3,8
4	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	2,6	2,2	2,4
5	Neurodermitis	2,1	2,5	2,3
6	Asthma bronchiale	1,6	2,8	2,2
7	Beeinträchtigung des Hörvermögens <sup>2</sup>	1,8	1,6	1,7
8	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,3	3,1	1,7
9	Strabismus (Schielen)	1,1	0,6	0,9
10	Bronchitisches Syndrom	0,4	0,3	0,4

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

<sup>1</sup> Brillenträger oder keine Brille aber handlungsbedürftige  
Visusminderung

<sup>2</sup> ab 2015 geänderte Grenzwerte bei Visus- und Hörtest

\* eingeschränkte Untersuchungstätigkeit aufgrund der Einbindung  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste in das Corona-  
Management

**Indikator  
SR3\_08\_L**

**Die häufigsten Screening-Befunde bei der SR3,  
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2018/2019**

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		4.505	4.350	8.855
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Beeinträchtigung der Sehschärfe <sup>1,2</sup>	10,4	9,0	9,7
2	Schädigung des Halte- und Stützapparates	6,1	4,6	5,4
3	Allergie	3,2	5,5	4,4
4	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	2,4	3,4	2,9
5	Asthma bronchiale	1,8	3,5	2,6
6	Neurodermitis	2,2	2,6	2,4
7	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,4	3,2	1,8
8	Beeinträchtigung des Hörvermögens <sup>2</sup>	1,5	1,7	1,6
9	Strabismus (Schielen)	0,8	0,8	0,8
10	Bronchitisches Syndrom	0,4	0,6	0,5

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

<sup>1</sup> Brillenträger oder keine Brille aber handlungsbedürftige  
Visusminderung

<sup>2</sup> ab 2015 geänderte Grenzwerte bei Visus- und Hörtest

**Indikator  
SR3\_08\_L**

**Die häufigsten Screening-Befunde bei der SR3,  
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2017/2018**

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		5.142	5.239	10.381
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Beeinträchtigung der Sehschärfe <sup>1,2</sup>	11,1	8,9	10,0
2	Schädigung des Halte- und Stützapparates	7,0	7,1	7,0
3	Allergie	4,6	6,1	5,4
4	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	2,9	3,0	3,0
5	Asthma bronchiale	1,9	3,4	2,6
6	Neurodermitis	2,8	2,2	2,5
7	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,7	3,6	2,2
8	Beeinträchtigung des Hörvermögens <sup>2</sup>	1,4	1,5	1,5
9	Strabismus (Schielen)	0,8	0,8	0,8
10	Bronchitisches Syndrom	0,4	0,7	0,5

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

<sup>1</sup> Brillenträger oder keine Brille aber handlungsbedürftige  
Visusminderung

<sup>2</sup> ab 2015 geänderte Grenzwerte bei Visus- und Hörtest

**Indikator  
SR3\_08\_L**

**Die häufigsten Screening-Befunde bei der SR3,  
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2016/2017**

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		5.141	5.138	10.279
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Beeinträchtigung der Sehschärfe <sup>1,2</sup>	11,9	9,3	10,6
2	Allergie	4,4	6,9	5,6
3	Schädigung des Halte- und Stützapparates	4,2	3,3	3,7
4	Asthma bronchiale	1,7	3,6	2,6
5	Beeinträchtigung des Hörvermögens <sup>2</sup>	2,5	2,6	2,5
6	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	2,1	2,7	2,4
7	Neurodermitis	2,6	1,8	2,2
8	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,4	3,7	2,1
9	Strabismus (Schielen)	0,8	0,8	0,8
10	Bronchitisches Syndrom	0,4	0,7	0,5

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

<sup>1</sup> Brillenträger oder keine Brille aber handlungsbedürftige  
Visusminderung

<sup>2</sup> ab 2015 geänderte Grenzwerte bei Visus- und Hörtest

Indikator  
SR3\_08\_L

Die häufigsten Screening-Befunde bei der SR3,  
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2015/2016

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		4.513	4.761	9.274
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Beeinträchtigung der Sehschärfe <sup>1,2</sup>	10,2	8,4	9,3
2	Allergie	3,3	6,0	4,7
3	Schädigung des Halte- und Stützapparates	3,8	2,7	3,3
4	Neurodermitis	2,7	2,7	2,7
5	Asthma bronchiale	1,8	3,6	2,7
6	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	2,5	2,7	2,6
7	Beeinträchtigung des Hörvermögens <sup>2</sup>	2,5	2,6	2,6
8	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,2	3,0	1,6
9	Strabismus (Schielen)	1,0	0,9	1,0
10	Bronchitisches Syndrom	0,4	0,7	0,5

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

<sup>1</sup> Brillenträger oder keine Brille aber handlungsbedürftige  
Visusminderung

<sup>2</sup> ab 2015 geänderte Grenzwerte bei Visus- und Hörtest

Indikator  
SR3\_08\_L

Die häufigsten Screening-Befunde bei der SR3,  
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Schuljahr 2014/2015

Rang	Anzahl der untersuchten Kinder	Mädchen	Jungen	Insgesamt
		3.068	3.156	6.224
	Befund	Kinder mit Befund in %		
1	Beeinträchtigung der Sehschärfe <sup>1,2</sup>	11,3	8,9	10,1
2	Allergie	4,7	7,9	6,3
3	Schädigung des Halte- und Stützapparates	6,6	5,4	6,0
4	Neurodermitis	3,1	3,2	3,2
5	Asthma bronchiale	2,1	3,2	2,7
6	Beeinträchtigung des räumlichen Sehens	1,9	3,1	2,5
7	Beeinträchtigung des Hörvermögens <sup>2</sup>	2,4	2,1	2,2
8	Beeinträchtigung des Farbsehens	0,5	3,6	2,0
9	Strabismus (Schielen)	1,2	1,0	1,1
10	Bronchitisches Syndrom	0,6	0,9	0,7

Datenquelle/Copyright:  
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt:  
Dokumentation der Schulreihenuntersuchungen  
der Kinder- und Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter

<sup>1</sup> Brillenträger oder keine Brille aber handlungsbedürftige  
Visusminderung

<sup>2</sup> ab 2015 geänderte Grenzwerte bei Visus- und Hörtest