

		Deutschland						Sachsen-Anhalt					
		1994/95	1997	2000	2004	2009	2016	1994/95	1997	2000	2004	2009	2016
6-7-Jährige, 1. Klasse	Anteil (%) der Kinder ohne Karies und ohne Initialkaries (idmft=0)	–	–	–	–	–	50	–	–	–	–	–	42,2
	Anteil (%) der Kinder mit naturgesundem Gebiss nach WHO (dmft=0)	35	43	47	48	52	56	20,4	30,7	33,0	34,9	42,8	44,4
	Anteil nicht versorgter kariöser Zähne (d/dmft)	57	57	57	56	46	43	–	53,3	56,8	50,0	45,4	46,7
	mittlerer dmf-t-Wert	2,89	2,39	2,21	2,16	1,87	1,73	3,82	3,20	3,06	2,91	2,31	2,31
	mittlerer dmf-t-Wert bei Kindern mit Karieserfahrung (dmft>0)	–	–	–	–	–	3,97	–	–	–	–	–	4,16
	Signifikant Caries Index (SiC _{dmft})	–	–	–	–	–	4,84	–	–	–	6,75	5,80	5,88
12-Jährige, 6. Klasse	Anteil (%) der Kinder ohne Karies und ohne Initialkaries (IDMFT=0)	–	–	–	–	–	68	–	–	–	–	–	73,0
	Anteil (%) der Kinder mit naturgesundem Gebiss nach WHO (DMFT=0)	30	39	52	60	69	79	20,6	28,3	41,8	53,8	67,4	76,7
	Anteil nicht versorgter kariöser Zähne (D/DMFT)	–	–	–	–	–	31,8*	–	10,60	15,60	18,20	21,10	24,8
	mittlerer DMF-T-Wert	2,44	1,75	1,21	0,98	0,72	0,44	2,60	2,41	1,68	1,26	0,76	0,52
	mittlerer DMF-T-Wert bei Kindern mit Karieserfahrung (DMFT>0)	–	–	–	–	–	2,07	–	–	–	–	–	2,21
	Signifikant Caries Index (SiC _{DMFT})	5,33	4,46	3,43	2,87	2,18	1,33	5,27	5,07	4,06	3,40	2,28	1,55

Datenquelle/Copyright: Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege: Dokumentationen zu den Epidemiologischen Begleituntersuchungen zur Gruppenprophylaxe

* Berechnet aus den mittleren DT- und DMFT-Werten für Deutschland

– keine Daten verfügbar

Vergleich der wichtigsten zahnmedizinischen Parameter von Kindern/Jugendlichen
in ausgewählten Altersgruppen, Sachsen-Anhalt (2015/2016)/Deutschland (2009)

		6-7-Jährige, Grundschule		12-Jährige, weiterführende Schulen		15-Jährige, weiterführende Schulen	
		Deutschland ¹ (Pieperstudie 2009)	Sachsen-Anhalt (ZRU 2015/2016)	Deutschland ¹ (Pieperstudie 2009)	Sachsen-Anhalt (ZRU 2015/2016) ²	Deutschland ¹ (Pieperstudie 2009)	Sachsen-Anhalt (ZRU 2015/2016) ²
Untersuchte		29.153	22.409	31.937	8.372	26.134	618
Gebissstatus	Anteil der Untersuchten mit naturgesundem Gebiss ³ (bezogen auf Milch- <u>und</u> Dauergebiss in allen Altersgruppen)	52,4%	42,9%	60,8%	50,7%	55,6%	44,4%
	Anteil der Untersuchten mit naturgesundem Gebiss ³ (bezogen auf Milch- (6-7-Jähr.) <u>bzw.</u> Dauergebiss (12-, 15-Jähr.))	53,2%	44,0%	69,2%	74,1%	56,2%	53,4%
	Anteil der Unters. mit behandlungsbedürftigem Gebiss ³ (bezogen auf Milch- <u>und</u> Dauergebiss in allen Altersgruppen)	32,6%	35,3%	16,2%	13,9%	16,4%	12,6%
	Anteil der Unters. mit behandlungsbedürftigem Gebiss ³ (bezogen auf Milch- (6-7-Jähr.) <u>bzw.</u> Dauergebiss (12-, 15-Jähr.))	–	36,4%	–	8,8%	–	12,3%
Zahnstatus	mittlerer dmf-t-Wert ⁴ (6-7-Jährige) bzw. mittlerer DMF-T-Wert ⁴ (12- und 15-Jährige)	1,87	2,29	0,72	0,57	1,41	1,34
	Anteil der durch Füllung sanierten Zähne unter allen Zähnen mit aktueller oder früherer Karies ³ (6-7-Jährige: f/dmf; 12- und 15-Jährige: F/DMF)	43,4%	43,6%	69,3%	67,0%	72,6%	74,2%
	Anteil der behandlungsbedürftigen Zähne unter allen Zähnen mit aktueller oder früherer Karies ³ (6-7-Jährige: d/dmf; 12- und 15-Jährige: D/DMF)	47,4%	44,5%	28,3%	28,5%	24,6%	20,5%
Versiegelungen	Anzahl versiegelter bleibender Zähne pro untersuchtem Kind/Jugendlichen ³	0,44	0,66	2,78	2,45	3,84	3,40

¹ inklusive Sachsen-Anhalt

² in Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamtschulen oder sonstigen weiterführenden Schulen

³ Deutschlandwerte: eigene Berechnung über das gewichtete Mittel* der Länderwerte in der Pieperstudie 2009
(*nach Anzahl der gemeldeten Schüler in der 1., 6., 9. Klasse in den verschiedenen Bundesländern im Jahr 2009. Quelle: www.destatis.de)

⁴ Deutschlandwerte: Originalwerte aus der Veröffentlichung der Pieperstudie 2009

– keine Daten verfügbar