

**Indikator (B/L)
3.23**

**Die häufigsten Diagnosen in der nervenärztlichen Praxis nach Geschlecht,
Nordrhein, 2015**

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der nervenärztl. Praxis	in % aller Behandlungsergebnisse		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	F32	Depressive Episode	18,3	19,6	16,3
2	F41	Andere Angststörungen	13,1	14,4	11,0
3	F33	Rezidivierende depressive Störung	11,1	12,3	9,2
4	G40	Epilepsie	8,4	7,1	10,6
5	G56	Mononeuropathien der oberen Extremität	7,9	8,9	6,4
6	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen	7,2	7,4	6,8
7	F06	Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit	6,8	7,0	6,6
8	F45	Somatoforme Störungen	6,7	7,4	5,6
9	G30	Alzheimer-Krankheit	6,2	7,0	4,9
10	I69	Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit	5,6	4,6	7,1
11	F20	Schizophrenie	5,6	4,9	6,6
12	G25	Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen	5,4	6,0	4,5
13	G47	Schlafstörungen	5,0	5,0	4,8
14	G62	Sonstige Polyneuropathien	4,8	4,6	5,2
15	G20	Primäres Parkinson-Syndrom	4,8	3,8	6,3
16	G43	Migräne	4,4	6,1	1,6
17	G44	Sonstige Kopfschmerzsyndrome	3,8	4,4	3,0
18	M54	Rückenschmerzen	3,8	4,0	3,5
19	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	3,5	3,3	3,7
20	F60	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	3,5	3,6	3,2
21	I67	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	3,3	3,3	3,1
22	G81	Hemiparese und Hemiplegie	3,2	2,8	3,9
23	G35	Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]	3,2	3,7	2,4
24	R26	Störungen des Ganges und der Mobilität	3,1	3,0	3,1
25	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	3,0	1,8	4,9
26	F34	Anhaltende affektive Störungen	3,0	3,5	2,2
27	R42	Schwindel und Taumel	3,0	3,2	2,6
28	F51	Nichtorganische Schlafstörungen	2,9	3,2	2,5
29	R45	Symptome, die die Stimmung betreffen	2,9	3,2	2,5
30	F03	Nicht näher bezeichnete Demenz	2,3	2,5	2,0

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2015.

Dieses ADT-Panel ist für Nordrhein typisch, so dass in anderen Bundesländern Abweichungen in der Rangfolge und in der Häufigkeit auftreten können.

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Indikator (B/L)
3.23

Die häufigsten Diagnosen in der nervenärztlichen Praxis nach Geschlecht, Nordrhein, 2014

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der nervenärztl. Praxis	in % aller Behandlungsergebnisse		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	F32	Depressive Episode	16,6	17,5	15,2
2	F41	Andere Angststörungen	10,8	12,0	8,8
3	F33	Rezidivierende depressive Störung	9,6	10,9	7,5
4	G56	Mononeuropathien der oberen Extremität	8,4	9,3	7,0
5	G40	Epilepsie	8,3	7,0	10,3
6	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen u. Anpassungsstör.	7,1	7,3	6,7
7	F45	Somatoforme Störungen	6,4	6,8	5,7
8	F06	And.psych.Stör.wg.Schäd./FktStör.Hirn od.körperl.Krkh.	6,3	6,4	6,2
9	G30	Alzheimer-Krankheit	5,3	6,1	4,1
10	F20	Schizophrenie	5,3	4,5	6,4
11	G25	Sonst. extrapyramid. Krankheiten u. Bewegungsstörungen	5,2	5,6	4,5
12	G20	Primäres Parkinson-Syndrom	5,1	4,0	6,9
13	I69	Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit	4,7	3,9	5,9
14	G62	Sonstige Polyneuropathien	4,7	4,3	5,3
15	G47	Schlafstörungen	4,7	4,6	4,7
16	G43	Migräne	4,5	6,2	1,7
17	G44	Sonstige Kopfschmerzsyndrome	3,8	4,4	2,9
18	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	3,7	3,6	4,0
19	F60	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	3,5	3,6	3,2
20	M54	Rückenschmerzen	3,4	3,5	3,3
21	G35	Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]	3,4	3,9	2,5
22	F34	Anhaltende affektive Störungen	3,2	3,7	2,3
23	I67	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	3,0	3,0	3,0
24	F51	Nichtorganische Schlafstörungen	2,8	3,1	2,4
25	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	2,7	1,6	4,5
26	R26	Störungen des Ganges und der Mobilität	2,7	2,6	2,9
27	G81	Hemiparese und Hemiplegie	2,7	2,4	3,3
28	F03	Nicht näher bezeichnete Demenz	2,7	2,9	2,4
29	R42	Schwindel und Taumel	2,6	2,7	2,3
30	R45	Symptome, die die Stimmung betreffen	2,4	2,6	2,0

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2014.

Dieses ADT-Panel ist für Nordrhein typisch, so dass in anderen Bundesländern Abweichungen in der Rangfolge und in der Häufigkeit auftreten können.

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Indikator (B/L)
3.23

Die häufigsten Diagnosen in der nervenärztlichen Praxis nach Geschlecht, Nordrhein, 2013

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der nervenärztl. Praxis	in % aller Behandlungsergebnisse		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	F32	Depressive Episode	16,2	17,0	14,9
2	F41	Andere Angststörungen	9,5	10,4	7,9
3	F33	Rezidivierende depressive Störung	8,4	9,6	6,6
4	G56	Mononeuropathien der oberen Extremität	8,3	9,4	6,8
5	G40	Epilepsie	8,3	7,0	10,2
6	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen u. Anpassungsstör.	7,2	7,3	7,1
7	F06	And.psych.Stör.wg.Schäd./FktStör.Hirn od.körperl.Krkh.	6,3	6,4	6,2
8	F45	Somatoforme Störungen	6,3	6,7	5,6
9	G20	Primäres Parkinson-Syndrom	5,7	4,6	7,4
10	G30	Alzheimer-Krankheit	5,5	6,2	4,6
11	F20	Schizophrenie	5,2	4,5	6,2
12	G25	Sonst. extrapyramid. Krankheiten u. Bewegungsstörungen	5,0	5,5	4,3
13	G62	Sonstige Polyneuropathien	4,5	4,0	5,3
14	G43	Migräne	4,3	6,0	1,7
15	I69	Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit	4,3	3,6	5,4
16	G47	Schlafstörungen	4,1	3,9	4,4
17	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	3,7	3,7	3,8
18	G44	Sonstige Kopfschmerzsyndrome	3,7	4,2	2,9
19	F60	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	3,5	3,6	3,5
20	G35	Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]	3,5	4,1	2,7
21	M54	Rückenschmerzen	3,5	3,7	3,3
22	F34	Anhaltende affektive Störungen	3,4	3,9	2,7
23	I67	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	3,2	3,2	3,2
24	R26	Störungen des Ganges und der Mobilität	3,2	3,2	3,2
25	F51	Nichtorganische Schlafstörungen	2,8	3,2	2,2
26	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	2,8	1,6	4,5
27	F03	Nicht näher bezeichnete Demenz	2,7	2,9	2,3
28	G81	Hemiparese und Hemiplegie	2,6	2,3	3,1
29	R42	Schwindel und Taumel	2,6	2,8	2,2
30	I63	Hirnfarkt	2,3	1,9	2,9

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2013.

Dieses ADT-Panel ist für Nordrhein typisch, so dass in anderen Bundesländern Abweichungen in der Rangfolge und in der Häufigkeit auftreten können.

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

**Indikator (B/L)
3.23**

**Die häufigsten Diagnosen in der nervenärztlichen Praxis nach Geschlecht,
Nordrhein, 2012**

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der nervenärztl. Praxis	in % aller Behandlungsergebnisse		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	F32	Depressive Episode	14,9	15,7	13,6
2	F41	Andere Angststörungen	9,7	10,8	8,0
3	G56	Mononeuropathien der oberen Extremität	8,9	10,0	7,1
4	G40	Epilepsie	8,2	7,0	10,0
5	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen u. Anpassungsstör.	8,1	8,1	8,0
6	F33	Rezidivierende depressive Störung	8,1	9,2	6,3
7	F06	And.psych.Stör.wg.Schäd./FktStör.Hirn od.körperl.Krkh.	7,4	7,5	7,2
8	F45	Somatoforme Störungen	7,2	7,7	6,4
9	G20	Primäres Parkinson-Syndrom	5,8	4,8	7,4
10	G30	Alzheimer-Krankheit	5,5	6,0	4,6
11	F20	Schizophrenie	4,9	4,3	5,7
12	G25	Sonst. extrapyramid. Krankheiten u. Bewegungsstörungen	4,7	5,1	4,1
13	G62	Sonstige Polyneuropathien	4,3	3,9	5,0
14	G43	Migräne	4,3	5,9	1,7
15	F60	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	3,9	3,8	4,0
16	G44	Sonstige Kopfschmerzsyndrome	3,9	4,5	2,9
17	F34	Anhaltende affektive Störungen	3,8	4,3	3,1
18	I69	Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit	3,7	3,1	4,6
19	G35	Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]	3,6	4,2	2,7
20	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	3,5	3,5	3,5
21	G47	Schlafstörungen	3,4	3,1	3,9
22	I67	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	3,4	3,4	3,4
23	M54	Rückenschmerzen	3,3	3,5	3,1
24	F03	Nicht näher bezeichnete Demenz	2,9	3,2	2,5
25	R42	Schwindel und Taumel	2,8	3,1	2,3
26	R26	Störungen des Ganges und der Mobilität	2,8	2,7	2,9
27	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	2,7	1,7	4,3
28	F51	Nichtorganische Schlafstörungen	2,7	3,0	2,3
29	G81	Hemiparese und Hemiplegie	2,4	2,2	2,8
30	F07	Persönlichk./Verhalt.Stör.wg.Krkh./Schäd./FktStör.Hirn	2,4	2,0	3,0

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2012.

Dieses ADT-Panel ist für Nordrhein typisch, so dass in anderen Bundesländern Abweichungen in der Rangfolge und in der Häufigkeit auftreten können.

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Indikator (B/L)
3.23

Die häufigsten Diagnosen in der nervenärztlichen Praxis nach Geschlecht, Nordrhein, 2011

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der nervenärztl. Praxis	in % aller Behandlungsergebnisse		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	F32	Depressive Episode	14,7	15,5	13,5
2	F41	Andere Angststörungen	9,9	10,9	8,2
3	G56	Mononeuropathien der oberen Extremität	9,6	10,8	7,7
4	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen	8,6	8,7	8,3
5	F33	Rezidivierende depressive Störung	8,3	9,6	6,4
6	F45	Somatoforme Störungen	8,2	8,8	7,3
7	G40	Epilepsie	8,0	6,7	10,0
8	F06	And. psych. Stör. wg. Schäd. / FktStör. Hirn oder körperl.Krankheiten	6,1	6,0	6,2
9	F20	Schizophrenie	5,2	4,6	6,1
10	G20	Primäres Parkinson-Syndrom	5,0	4,1	6,4
11	G25	Sonstige extrapyramid. Krankheiten und Bewegungsstörungen	4,4	4,9	3,7
12	G43	Migräne	4,2	5,8	1,8
13	G44	Sonstige Kopfschmerzsyndrome	4,2	4,8	3,3
14	F60	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	4,2	4,0	4,4
15	G62	Sonstige Polyneuropathien	4,2	3,8	4,7
16	F34	Anhaltende affektive Störungen	4,0	4,6	3,3
17	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	4,0	4,1	3,7
18	M54	Rückenschmerzen	4,0	4,2	3,6
19	G30	Alzheimer-Krankheit	3,9	4,4	3,2
20	G35	Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]	3,5	4,1	2,5
21	I67	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	3,3	3,4	3,2
22	R42	Schwindel und Taumel	3,1	3,5	2,6
23	G47	Schlafstörungen	3,1	2,8	3,4
24	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	2,8	1,6	4,6
25	F51	Nichtorganische Schlafstörungen	2,5	2,7	2,3
26	F07	Persönlichk. / Verhalt. Stör. wegen Krkh. / Schäd. / FktStör. Hirn	2,5	2,1	3,1
27	I63	Hirnfarkt	2,5	1,9	3,4
28	I69	Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit	2,4	2,0	2,9
29	M53	Sonstige Krankheiten von Wirbelsäule / Rücken, and.nicht klass.	2,4	2,5	2,1
30	F03	Nicht näher bezeichnete Demenz	2,3	2,6	1,9

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2011.

Dieses ADT-Panel ist für Nordrhein typisch, so dass in anderen Bundesländern Abweichungen in der Rangfolge und in der Häufigkeit auftreten können.

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Indikator (B/L)
3.23

Die häufigsten Diagnosen in der nervenärztlichen Praxis nach Geschlecht, Nordrhein, 2010

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der nervenärztl. Praxis	in % aller Behandlungsergebnisse		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	F32	Depressive Episode	15,6	16,9	13,7
2	F41	Andere Angststörungen	9,8	10,8	8,0
3	G56	Mononeuropathien der oberen Extremität	9,3	10,4	7,7
4	G40	Epilepsie	8,6	7,3	10,8
5	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen u. Anpassungsstör.	8,6	8,6	8,4
6	F45	Somatoforme Störungen	7,9	8,4	7,2
7	F33	Rezidivierende depressive Störung	7,2	8,4	5,3
8	F06	And.psych.Stör.wg.Schäd./FktStör.Hirn od.körperl.Krkh.	6,7	6,7	6,7
9	F20	Schizophrenie	5,7	5,0	6,6
10	G20	Primäres Parkinson-Syndrom	5,4	4,5	6,7
11	G62	Sonstige Polyneuropathien	4,4	4,0	5,0
12	G44	Sonstige Kopfschmerzsyndrome	4,3	4,9	3,4
13	F60	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	4,3	4,2	4,4
14	G43	Migräne	4,2	5,8	1,9
15	G25	Sonst. extrapyramid. Krankheiten u. Bewegungsstörungen	4,1	4,5	3,5
16	G30	Alzheimer-Krankheit	4,0	4,6	3,0
17	F34	Anhaltende affektive Störungen	3,7	4,1	3,1
18	I67	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	3,5	3,7	3,3
19	I63	Hirinfarkt	3,5	2,6	4,8
20	M54	Rückenschmerzen	3,4	3,4	3,5
21	G35	Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]	3,3	3,9	2,4
22	R42	Schwindel und Taumel	3,2	3,5	2,8
23	G47	Schlafstörungen	3,2	3,1	3,4
24	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	2,9	1,6	4,7
25	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	2,8	2,7	3,0
26	F07	Persönlichk./Verhalt.Stör.wg.Krkh./Schäd./FktStör.Hirn	2,5	2,1	3,0
27	F03	Nicht näher bezeichnete Demenz	2,4	2,7	2,1
28	M53	Sonst. Krankh. v. Wirbelsäule/Rücken, and.nicht klass.	2,2	2,2	2,1
29	F40	Phobische Störungen	2,1	2,1	2,1
30	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	1,9	1,8	2,1

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2011

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Indikator (B/L)
3.23

Die häufigsten Diagnosen in der nervenärztlichen Praxis nach Geschlecht, Nordrhein, 2009

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der nervenärztl. Praxis	in % aller Behandlungsergebnisse		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	F32	Depressive Episode	15,2	16,8	12,9
2	G40	Epilepsie	9,2	7,9	11,2
3	F41	Andere Angststörungen	9,0	10,0	7,5
4	G56	Mononeuropathien der oberen Extremität	8,8	9,8	7,2
5	F45	Somatoforme Störungen	7,7	8,2	7,1
6	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen u. Anpassungsstör.	7,6	7,7	7,3
7	F33	Rezidivierende depressive Störung	7,0	8,3	5,2
8	F06	And.psych.Stör.wg.Schäd./FktStör.Hirn od.körperl.Krkh.	7,0	7,0	6,9
9	G20	Primäres Parkinson-Syndrom	6,3	5,2	7,9
10	F20	Schizophrenie	6,3	5,6	7,4
11	G44	Sonstige Kopfschmerzsyndrome	4,5	5,1	3,6
12	G62	Sonstige Polyneuropathien	4,4	4,0	5,0
13	G43	Migräne	4,3	5,9	2,0
14	G30	Alzheimer-Krankheit	4,2	4,7	3,4
15	G25	Sonst. extrapyramid. Krankheiten u. Bewegungsstörungen	4,2	4,7	3,4
16	F60	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	4,0	3,9	4,1
17	I67	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	3,9	4,1	3,7
18	F34	Anhaltende affektive Störungen	3,6	4,1	3,0
19	G35	Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]	3,5	4,1	2,6
20	I63	Hirnfarkt	3,4	2,5	4,7
21	M54	Rückenschmerzen	3,2	3,3	3,2
22	R42	Schwindel und Taumel	3,2	3,4	3,0
23	G47	Schlafstörungen	3,2	3,2	3,2
24	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	2,7	1,5	4,4
25	F03	Nicht näher bezeichnete Demenz	2,5	2,8	2,2
26	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	2,5	2,5	2,7
27	F07	Persönlichk./Verhalt.Stör.wg.Krkh./Schäd./FktStör.Hirn	2,5	2,1	3,0
28	M53	Sonst. Krankh. v. Wirbelsäule/Rücken, and.nicht klass.	2,1	2,2	2,1
29	H81	Störungen der Vestibularfunktion	2,0	2,3	1,7
30	I65	Verschluss/Stenos.präzerebr.Arter.oh.resultHirnfarkt	2,0	1,6	2,6

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ZI-ADT-Panel Nordrhein: Gesamtjahr 2010

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

**Indikator (B/L)
3.23**

Die häufigsten Diagnosen in der nervenärztlichen Praxis nach Geschlecht, Nordrhein, 2008

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der nervenärztl. Praxis	in % aller Behandlungsergebnisse		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	F32	Depressive Episode	14,5	15,9	12,3
2	G56	Mononeuropathien der oberen Extremität	9,3	10,3	7,7
3	G40	Epilepsie	9,0	7,7	11,0
4	F41	Andere Angststörungen	8,3	9,3	6,7
5	F45	Somatoforme Störungen	7,5	8,0	6,9
6	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen u. Anpassungsstörungen	7,5	7,6	7,2
7	F33	Rezidivierende depressive Störungen	7,1	8,5	5,1
8	F06	And. psych. Störg. wg. Gehirnschäd./-Stör. od. körperl. Krankh.	7,0	6,9	7,1
9	F20	Schizophrenie	6,1	5,5	7,0
10	G20	Primäres Parkinson-Syndrom	5,7	4,8	6,9
11	G44	Sonstige Kopfschmerzsyndrome	5,3	5,9	4,3
12	G62	Sonstige Polyneuropathien	4,8	4,5	5,4
13	G25	Sonstige extrapyramidale Krankheiten u. Bewegungsstörungen	4,3	4,7	3,6
14	G43	Migräne	4,2	5,7	1,9
15	G30	Alzheimer Krankheit	4,2	4,8	3,3
16	F60	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	4,0	3,8	4,3
17	I67	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	4,0	4,2	3,7
18	F34	Anhaltende affektive Störungen	3,8	4,4	2,9
19	M54	Rückenschmerzen	3,6	3,7	3,4
20	I63	Hirnfarkt	3,4	2,5	4,7
21	R42	Schwindel und Taumel	3,2	3,4	2,9
22	G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	3,2	3,7	2,5
23	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	2,9	3,0	3,0
24	F03	Nicht näher bezeichnete Demenz	2,9	3,2	2,4
25	G47	Schlafstörungen	2,9	2,7	3,2
26	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	2,7	1,5	4,5
27	F07	Persönlichk./Verhalt.Stör.wg.Krankh./Schäd./FktStör.Hirn	2,6	2,2	3,1
28	M53	Sonst. Krankh. v. Wirbelsäule/Rücken, and. nicht klass.	2,6	2,7	2,4
29	H81	Störungen der Vestibularfunktion	2,4	2,7	2,0
30	G45	Zerebr. transitor.ischäm. Attacken u. verwandte Syndrome	2,2	2,2	2,2

Datenquelle/Copyright:
Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:
ADT-Panel Nordrhein

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich
** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Indikator (B)
3.23

Die häufigsten Diagnosen in der nervenärztlichen Praxis nach Geschlecht, Nordrhein, 2007

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der nervenärztl. Praxis	in % aller Behandlungsergebnisse		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	F32	Depressive Episode	14,5	16,1	12,0
2	G40	Epilepsie	9,1	7,7	11,3
3	G56	Mononeuropathien der oberen Extremität	8,6	9,6	6,9
4	F41	Andere Angststörungen	8,5	9,6	6,8
5	F45	Somatoforme Störungen	7,7	8,3	6,7
6	F33	Rezidivierende depressive Störung	7,3	8,8	4,9
7	F06	And.psych.Stör.wg.Schäd./FktStör.Hirn od.körperl.Krkh.	7,0	6,9	7,1
8	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen u. Anpassungsstör.	6,7	6,8	6,5
9	F20	Schizophrenie	6,7	5,9	7,8
10	G20	Primäres Parkinson-Syndrom	5,4	4,5	6,8
11	G44	Sonstige Kopfschmerzsyndrome	5,2	5,8	4,2
12	G62	Sonstige Polyneuropathien	4,6	4,2	5,2
13	I67	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	4,2	4,4	3,9
14	F60	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	4,1	4,0	4,3
15	G43	Migräne	4,1	5,6	1,7
16	G25	Sonst. extrapyramid. Krankheiten u. Bewegungsstörungen	4,0	4,3	3,6
17	G30	Alzheimer-Krankheit	3,9	4,4	3,2
18	F34	Anhaltende affektive Störungen	3,7	4,3	2,8
19	G35	Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]	3,2	3,7	2,6
20	I63	Hirnfarkt	3,2	2,5	4,3
21	R42	Schwindel und Taumel	3,1	3,3	2,8
22	M54	Rückenschmerzen	3,0	3,0	3,0
23	G47	Schlafstörungen	3,0	2,9	3,2
24	F51	Nichtorganische Schlafstörungen	2,7	2,9	2,3
25	F03	Nicht näher bezeichnete Demenz	2,6	2,8	2,2
26	H81	Störungen der Vestibularfunktion	2,5	2,8	2,1
27	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	2,5	1,5	4,1
28	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	2,5	2,3	2,6
29	F07	Persönlich./Verhalt.Stör.wg.Krkh./Schäd./FktStör.Hirn	2,4	2,2	2,9
30	G45	Zerebrale transitor. Ischämie und verwandte Syndrome	2,3	2,4	2,0

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ADT-Panel

Stand: 27.01.2009

**Indikator (B)
3.23**

Die häufigsten Diagnosen in der nervenärztlichen Praxis nach Geschlecht, Nordrhein, 2006

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der nervenärztl. Praxis	in % aller Behandlungsergebnisse		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	F32	Depressive Episode	13,7	15,2	11,1
2	G40	Epilepsie	9,0	7,7	11,2
3	G56	Mononeuropathien der oberen Extremität	8,9	10,0	7,3
4	F45	Somatoforme Störungen	8,6	8,9	8,0
5	F41	Andere Angststörungen	8,1	9,1	6,5
6	F20	Schizophrenie	6,6	5,8	7,8
7	F33	Rezidivierende depressive Störung	6,5	7,9	4,5
8	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen u. Anpassungsstör.	6,1	6,2	5,8
9	F06	And.psych.Stör.wg.Schäd./FktStör.Hirn od.körperl.Krkh.	6,1	5,8	6,6
10	G44	Sonstige Kopfschmerzsyndrome	5,5	6,3	4,2
11	G20	Primäres Parkinson-Syndrom	4,9	4,1	6,1
12	G62	Sonstige Polyneuropathien	4,6	4,1	5,3
13	G43	Migräne	4,0	5,5	1,8
14	G25	Sonst. extrapyramid. Krankheiten u. Bewegungsstörungen	3,9	4,3	3,5
15	G30	Alzheimer-Krankheit	3,9	4,5	3,0
16	F34	Anhaltende affektive Störungen	3,8	4,5	2,8
17	F60	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	3,7	3,6	3,7
18	I67	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	3,5	3,7	3,3
19	R42	Schwindel und Taumel	3,3	3,5	3,1
20	G35	Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]	3,3	3,7	2,7
21	M54	Rückenschmerzen	3,1	3,2	3,0
22	I63	Hirnfarkt	2,9	2,3	3,8
23	G47	Schlafstörungen	2,7	2,5	3,0
24	F51	Nichtorganische Schlafstörungen	2,5	2,7	2,2
25	H81	Störungen der Vestibularfunktion	2,4	2,7	2,0
26	F07	Persönlichk./Verhalt.Stör.wg.Krkh./Schäd./FktStör.Hirn	2,4	2,1	3,0
27	G45	Zerebrale transitor. Ischämie und verwandte Syndrome	2,4	2,6	2,2
28	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	2,4	2,3	2,5
29	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	2,2	1,2	3,7
30	I65	Verschluss/Stenos.präzer.Arterien oh.result.Hirnfarkt	2,1	1,7	2,6

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ADT-Panel

Stand: 26.01.2009

Indikator (B)
3.23

Die häufigsten Diagnosen in der nervenärztlichen Praxis nach Geschlecht, Deutschland, 2005

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der nervenärztl. Praxis	in % aller Behandlungsergebnisse		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	F32	Depressive Episode	13,5	15,4	10,8
2	F45	Somatoforme Störungen	9,7	9,5	10,2
3	G56	Mononeuropathien der oberen Extremität	8,9	9,9	7,5
4	G40	Epilepsie	8,7	7,4	10,7
5	F41	Andere Angststörungen	7,5	8,3	6,3
6	F06	And.psych.Stör.wg.Schäd./-FktStör.Hirn od.körperl.Krkh.	6,3	6,0	6,7
7	F20	Schizophrenie	6,1	5,5	7,0
8	F33	Rezidivierende depressive Störung	5,9	7,3	4,0
9	G44	Sonstige Kopfschmerzsyndrome	5,7	6,3	4,8
10	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen u. Anpassungsstör.	5,5	5,6	5,2
11	G20	Primäres Parkinson-Syndrom	4,9	4,1	6,2
12	G62	Sonstige Polyneuropathien	4,4	3,9	5,2
13	G43	Migräne	4,1	5,6	2,0
14	G25	Sonst. extrapyramid. Krankheiten u. Bewegungsstörungen	3,7	4,0	3,2
15	F34	Anhaltende affektive Störungen	3,6	4,3	2,5
16	G30	Alzheimer-Krankheit	3,5	4,1	2,6
17	F60	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	3,4	3,3	3,7
18	R42	Schwindel und Taumel	3,3	3,4	3,1
19	G35	Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]	3,1	3,5	2,6
20	M54	Rückenschmerzen	3,1	3,2	3,0
21	I67	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	3,1	3,3	2,8
22	G45	Zerebrale transitor. Ischämie und verwandte Syndrome	2,9	3,2	2,6
23	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	2,7	2,6	2,7
24	I63	Hirinfarkt	2,5	2,1	3,2
25	H81	Störungen der Vestibularfunktion	2,5	2,7	2,2
26	G47	Schlafstörungen	2,5	2,4	2,6
27	F48	Andere neurotische Störungen	2,5	2,8	2,0
28	M53	Sonst. Krankh. v. Wirbelsäule/Rücken, and.nicht klass.	2,2	2,4	2,0
29	F51	Nichtorganische Schlafstörungen	2,1	2,3	1,9
30	I65	Verschluss/Stenos.präzer.Arterien oh.result.Hirnfarkt	2,1	1,9	2,4

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ADT-Panel

Stand: 26.01.2009

Indikator (B)
3.23

Die häufigsten Diagnosen in der nervenärztlichen Praxis nach Geschlecht, Deutschland, 2004

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der nervenärztl. Praxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	F32	Depressive Episode	14,0	15,8	11,2
2	F45	Somatoforme Störungen	9,9	9,6	10,5
3	G56	Mononeuropathien der oberen Extremität	8,6	9,7	7,2
4	G40	Epilepsie	8,2	6,7	10,4
5	F41	Andere Angststörungen	7,1	7,8	6,2
6	F06	And.psych.Stör.wg.Gehirnschäd./-Stör.od.körperl.Krkh.	5,6	5,2	6,2
7	F20	Schizophrenie	5,6	5,0	6,2
8	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstör.	5,5	5,5	5,4
9	F33	Rezidivierende depressive Störung	5,3	6,4	3,8
10	G44	Sonstige Kopfschmerzsyndrome	5,2	5,8	4,4
11	G62	Sonstige Polyneuropathien	4,8	4,3	5,5
12	G20	Primäres Parkinson-Syndrom	4,8	3,9	6,1
13	I67	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	4,5	4,9	4,1
14	R42	Schwindel und Taumel	3,9	4,3	3,5
15	G43	Migräne	3,7	4,9	2,0
16	M54	Rückenschmerzen	3,6	3,7	3,5
17	F34	Anhaltende affektive Störungen	3,3	4,0	2,2
18	F60	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	3,2	3,0	3,4
19	G35	Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]	3,1	3,5	2,5
20	G25	Sonstige extrapyramidale Krankheiten u.Bewegungsstör.	3,0	3,1	2,9
21	R51	Kopfschmerz	2,8	3,2	2,4
22	G30	Alzheimer-Krankheit	2,8	3,4	2,0
23	F48	Andere neurotische Störungen	2,5	2,8	2,2
24	G45	Zerebr.transitor.ischäm.Attacken u.verwandte Syndr.	2,5	2,6	2,4
25	F03	Nicht näher bezeichnete Demenz	2,4	2,6	2,2
26	I63	Hirnfarkt	2,3	1,9	3,0
27	M53	Sonst.Krankh.d.Wirbelsäule u.d.Rückens,and.ni.klass.	2,3	2,5	2,1
28	H81	Störungen der Vestibularfunktion	2,3	2,4	1,9
29	G47	Schlafstörungen	2,2	2,1	2,4
30	I65	Verschuß/Stenos.präzer.Arterien oh.result.Hirnfarkt	2,2	2,0	2,4

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ADT-Panel

Stand: 19.08.2005

**Indikator (B)
3.23**

Die häufigsten Diagnosen in der nervenärztlichen Praxis nach Geschlecht, Deutschland, 2003

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der nervenärztl. Praxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	F32	Depressive Episode	13,2	14,8	10,4
2	F45	Somatoforme Störungen	9,6	9,4	10,3
3	G56	Mononeuropathien der oberen Extremität	8,3	9,4	7,3
4	G40	Epilepsie	8,0	6,6	10,2
5	F41	Andere Angststörungen	6,9	7,7	6,1
6	F06	And.psych.Stör.wg.Gehirnschäd./-Stör.od.körperl.Krkh.	5,8	5,3	6,5
7	G44	Sonstige Kopfschmerzsyndrome	5,3	6,0	4,6
8	F20	Schizophrenie	5,2	4,5	5,6
9	F33	Rezidivierende depressive Störung	5,1	5,9	3,4
10	I67	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	4,9	5,3	4,4
11	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen u. Anpassungsstör.	4,8	5,1	4,2
12	G62	Sonstige Polyneuropathien	4,6	4,2	5,4
13	G20	Primäres Parkinson-Syndrom	4,4	3,7	5,7
14	M54	Rückenschmerzen	4,1	4,4	3,9
15	F34	Anhaltende affektive Störungen	3,7	4,7	2,4
16	R42	Schwindel und Taumel	3,7	4,0	3,6
17	G43	Migräne	3,7	5,0	2,0
18	F60	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	3,3	3,2	3,4
19	G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	2,9	3,4	2,4
20	G45	Zerebr. transitor.ischäm. Attacken u.verwandte Syndr.	2,9	3,2	2,6
21	G25	Sonstige extrapyramidale Krankheiten u.Bewegungsstör.	2,8	3,0	2,5
22	F48	Andere neurotische Störungen	2,6	3,1	2,2
23	R51	Kopfschmerz	2,6	2,9	2,3
24	G30	Alzheimer-Krankheit	2,3	2,7	1,7
25	I63	Hirnfarkt	2,2	1,8	2,8
26	F03	Nicht näher bezeichnete Demenz	2,1	2,3	1,9
27	H81	Störungen der Vestibularfunktion	2,1	2,2	1,9
28	M53	Sonst. Krankh.d.Wirbelsäule u.d.Rückens,and.ni.klass.	2,1	2,2	2,1
29	I65	Verschuß/Stenos.extrakt.hirnversorg.Art. oh.Hirnf.	2,0	1,9	2,3
30	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1,9	1,2	2,9

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ADT-Panel

Stand: 09.09.2016

Indikator (B)
3.23

Die häufigsten Diagnosen in der nervenärztlichen Praxis nach Geschlecht, Deutschland, 2002

Rang	ICD-10	Diagnosen (Behandlungsanlass)* in der nervenärztl. Praxis	in % aller Behandlungsfälle		
			insg.**	darunter:	
				Frauen	Männer
1	F32	Depressive Episode	14,1	16,1	10,8
2	F45	Somatoforme Störungen	10,1	9,5	11,4
3	G56	Mononeuropathien der oberen Extremität	8,0	9,1	7,0
4	G40	Epilepsie	7,9	6,4	10,1
5	F41	Andere Angststörungen	6,8	7,5	6,0
6	G44	Sonstige Kopfschmerzsyndrome	6,0	6,7	5,4
7	F06	And.psych.Stör.wg.Gehirnschäd./-Stör.od.körperl.Krkh.	6,0	5,7	6,5
8	F33	Rezidivierende depressive Störung	5,3	6,4	3,9
9	M54	Rückenschmerzen	5,1	5,4	4,9
10	F20	Schizophrenie	5,0	4,3	5,3
11	G62	Sonstige Polyneuropathien	4,7	4,2	5,7
12	I67	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	4,7	5,1	4,5
13	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen u. Anpassungsstör.	4,7	4,9	4,0
14	G20	Primäres Parkinson-Syndrom	4,4	3,6	5,7
15	G43	Migräne	3,9	5,2	2,2
16	R42	Schwindel und Taumel	3,8	4,2	3,7
17	F60	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	3,4	3,4	3,4
18	G45	Zerebr. transitor.ischäm. Attacken u.verwandte Syindr.	3,4	3,8	2,9
19	F34	Anhaltende affektive Störungen	3,2	3,9	2,1
20	G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	2,9	3,3	2,4
21	G25	Sonstige extrapyramidale Krankheiten u.Bewegungsstör.	2,7	2,8	2,4
22	F48	Andere neurotische Störungen	2,7	3,1	2,2
23	F03	Nicht näher bezeichnete Demenz	2,4	2,7	2,0
24	G30	Alzheimer-Krankheit	2,4	2,9	1,8
25	I63	Hirnfarkt	2,4	2,0	3,0
26	H81	Störungen der Vestibularfunktion	2,3	2,4	2,1
27	I65	Verschuß/Stenos.extrakt.hirnversorg.Art. oh.Hirnf.	2,3	2,2	2,5
28	R51	Kopfschmerz	2,3	2,5	2,0
29	G47	Schlafstörungen	1,9	1,7	2,0
30	M53	Sonst. Krankh.d.Wirbelsäule u.d.Rückens,and.ni.klass.	1,9	2,1	1,8

* Mehrfachzählungen von Patienten möglich

** einschließlich Fälle ohne Geschlecht

Datenquelle/Copyright:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung:

ADT-Panel

Stand: 09.09.2016