

Indikator (L)  
3.56

Häufigste Todesursachen von Säuglingen, darunter plötzlicher Kindstod,  
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2023

Rang	Häufigste Todesursache von Säuglingen			
	ICD-10 3-stellig	Diagnose	weiblich	
			Anzahl	Anzahl in % *
1	R95	Plötzlicher Kindstod	3	15,00
2	P02	Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	2	10,00
3	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	2	10,00
4	R99	Sonstige ungenau oder n.n.bez. Todesursachen	2	10,00
sonst.			11	55,00
<b>insges.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>20</b>	<b>100</b>
Rang	ICD-10 3-stellig	Diagnose	männlich	
			Anzahl	Anzahl in % *
1	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	3	17,65
2	Q23	Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	2	11,76
sonst.			12	70,59
<b>insges.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>17</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2025: Todesursachenstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

\*Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der Altersgruppe und des Geschlechts

Indikator (L)  
3.56

Häufigste Todesursachen von Säuglingen, darunter plötzlicher Kindstod,  
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2022

Rang	Häufigste Todesursache von Säuglingen			
	ICD-10 3-stellig	Diagnose	weiblich	
			Anzahl	Anzahl in % *
1	R99	Sonstige ungenau oder n.n.bez. Todesursachen	12	50,00
2	P21	Asphyxie unter der Geburt	2	8,33
3	Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	2	8,33
sonst.			8	33,33
<b>insges.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>24</b>	<b>100</b>
Rang	ICD-10 3-stellig	Diagnose	männlich	
			Anzahl	Anzahl in % *
1	R95	Plötzlicher Kindstod	3	12,00
2	P02	Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Komplika- tionen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	2	8,00
3	Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	2	8,00
4	Q25	Angeborene Fehlbildungen der großen Arterien	2	8,00
5	Q79	Angeb. Fehlbild. des Muskel-Skelett-Systems, a.n.k.	2	8,00
sonst.			14	56,00
<b>insges.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>25</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2024: Todesursachenstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

\*Anteil der Todesursache an allen  
Sterbefällen der Altersgruppe und  
des Geschlechts

Indikator (L)  
3.56

Häufigste Todesursachen von Säuglingen, darunter plötzlicher Kindstod,  
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2021

Häufigste Todesursache von Säuglingen				
Rang	ICD-10 3-stellig	Diagnose	weiblich	
			Anzahl	Anzahl in % *
1	P02	Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	2	10,00
2	P21	Asphyxie unter der Geburt	2	10,00
3	Q00	Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	2	10,00
4	Q04	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gehirns	2	10,00
sonst.			12	60,00
<b>insges.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>20</b>	<b>100</b>
Rang	ICD-10 3-stellig	Diagnose	männlich	
			Anzahl	Anzahl in % *
1	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	7	20,59
2	P00	Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Zustände der Mutter, die zur vorliegenden Schwangerschaft keine Beziehung haben müssen	2	5,88
3	P28	Sonstige Störungen der Atmung mit Ursprung in der Perinatalperiode	2	5,88
4	P29	Kardiovaskuläre Krankheiten mit Ursprung in der Perinatalperiode	2	5,88
5	Q79	Angeb. Fehlbild. des Muskel-Skelett-Systems, a.n.k.	2	5,88
6	Q92	Sonstige Trisomien und partielle Trisomien der Autosomen, anderenorts nicht klassifiziert	2	5,88
sonst.			17	50,00
<b>insges.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>34</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2023: Todesursachenstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

\*Anteil der Todesursache an allen  
Sterbefällen der Altersgruppe und  
des Geschlechts

Indikator (L)  
3.56

Häufigste Todesursachen von Säuglingen, darunter plötzlicher Kindstod,  
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2020

Häufigste Todesursache von Säuglingen				
Rang	ICD-10 3-stellig	Diagnose	weiblich	
			Anzahl	Anzahl in % *
1	P02	Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	4	14,29
2	Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	2	7,14
3	Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	2	7,14
sonst.			20	71,43
<b>insges.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>28</b>	<b>100</b>
Rang	ICD-10 3-stellig	Diagnose	männlich	
			Anzahl	Anzahl in % *
1	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	5	13,89
2	R95	Plötzlicher Kindstod	4	11,11
3	P02	Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	2	5,56
4	Q60	Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere	2	5,56
sonst.			23	63,89
<b>insges.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>36</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2022: Todesursachenstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

\*Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der Altersgruppe und des Geschlechts

**Indikator (L)**  
**3.56**

**Häufigste Todesursachen von Säuglingen, darunter plötzlicher Kindstod,  
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2019**

Häufigste Todesursachen von Säuglingen: <b>weiblich</b>				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	P29	Kardiovaskuläre Krankheiten mit Ursprung in der Perinatalperiode	2	14,3
sonst.			12	85,7
<b>insg.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>14</b>	<b>100</b>
Häufigste Todesursachen von Säuglingen: <b>männlich</b>				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	P21	Asphyxie unter der Geburt	3	13,0
2	P02	Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	2	8,7
3	P29	Kardiovaskuläre Krankheiten mit Ursprung in der Perinatalperiode	2	8,7
4	Q26	Angeborene Fehlbildungen der großen Venen	2	8,7
sonst.			14	60,9
<b>insg.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>23</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2020: Todesursachenstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

\*Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der Altersgruppe und des Geschlechts

**Indikator (L)**  
**3.56**

**Häufigste Todesursachen von Säuglingen, darunter plötzlicher Kindstod,  
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2018**

Häufigste Todesursachen von Säuglingen: <b>weiblich</b>				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	P28	Sonstige Störungen der Atmung mit Ursprung in der Perinatalperiode	2	13,3
2	Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	2	13,3
sonst.			11	73,3
<b>insg.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>15</b>	<b>100</b>
Häufigste Todesursachen von Säuglingen: <b>männlich</b>				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	P52	Intrakranielle nichttraumatische Blutung beim Fetus und Neugeborenen	4	11,8
2	G71	Primäre Myopathien	2	5,9
3	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	2	5,9
4	P02	Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	2	5,9
5	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	2	5,9
6	Q22	Angeb. Fehlb. der Pulmonal- u. der Trikuspidalklappe	2	5,9
7	S06	Intrakranielle Verletzung	2	5,9
sonst.			18	52,9
<b>insg.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>34</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2020: Todesursachenstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

\*Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der Altersgruppe und des Geschlechts

**Indikator (L)**  
**3.56**

**Häufigste Todesursachen von Säuglingen, darunter plötzlicher Kindstod,  
nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2017**

Häufigste Todesursachen von Säuglingen: <b>weiblich</b>				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	Q25	Angeborene Fehlbildungen der großen Arterien	3	8,8
2	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	2	5,9
3	P28	Sonstige Störungen der Atmung mit Ursprung in der Perinatalperiode	2	5,9
4	P29	Kardiovaskuläre Krankheiten mit Ursprung in der Perinatalperiode	2	5,9
5	P77	Enterocolitis necroticans beim Fetus und Neugeborenen	2	5,9
6	Q21	Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten	2	5,9
7	R95	Plötzlicher Kindstod	2	5,9
sonst.			19	55,9
<b>insg.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>34</b>	<b>100</b>
Häufigste Todesursachen von Säuglingen: <b>männlich</b>				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	4	10,5
2	P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	4	10,5
3	P28	Sonstige Störungen der Atmung mit Ursprung in der Perinatalperiode	3	7,9
4	Q24	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens	3	7,9
5	P02	Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	2	5,3
6	P21	Asphyxie unter der Geburt	2	5,3
7	Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	2	5,3
8	Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	2	5,3
9	R95	Plötzlicher Kindstod	2	5,3
sonst.			14	36,8
<b>insg.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>38</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2019: Todesursachenstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

\*Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der Altersgruppe und des Geschlechts

**Indikator (L)**  
**3.56**

**Häufigste Todesursachen von Säuglingen, darunter plötzlicher Kindstod,  
nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2016**

Häufigste Todesursachen von Säuglingen: <b>weiblich</b>				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	3	10,7
2	Q20	Angeborene Fehlbildungen der Herzhöhlen und verbindender Strukturen	3	10,7
sonst.			22	78,6
<b>insg.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>28</b>	<b>100</b>
Häufigste Todesursachen von Säuglingen: <b>männlich</b>				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	6	25,0
2	P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	2	8,3
3	P29	Kardiovaskuläre Krankheiten mit Ursprung in der Perinatalperiode	2	8,3
4	R95	Plötzlicher Kindstod	2	8,3
sonst.			12	50,0
<b>insg.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>24</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2018: Todesursachenstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

\*Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der Altersgruppe und des Geschlechts

Indikator (L)  
3.56

Häufigste Todesursachen von Säuglingen, darunter plötzlicher Kindstod,  
nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2015

Häufigste Todesursachen von Säuglingen: weiblich				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	P21	Asphyxie unter der Geburt	3	10,7
2	Q79	Angeb. Fehlbild. des Muskel-Skelett-Systems, a.n.k.	3	10,7
3	G12	Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome	2	7,1
4	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	2	7,1
5	P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	2	7,1
6	P24	Aspirationssyndrome beim Neugeborenen	2	7,1
7	P28	Sonstige Störungen der Atmung mit Ursprung in der Perinatalperiode	2	7,1
8	Q25	Angeborene Fehlbildungen der großen Arterien	2	7,1
sonst.			10	35,7
<b>insg.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>28</b>	<b>100</b>
Häufigste Todesursachen von Säuglingen: männlich				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	6	16,2
2	R95	Plötzlicher Kindstod	4	10,8
3	P21	Asphyxie unter der Geburt	2	5,4
4	P28	Sonstige Störungen der Atmung mit Ursprung in der Perinatalperiode	2	5,4
5	P83	Sonst. Krankh.szustände mit Beteil. der Haut, die für den Feten u. das Neugeb. spezifisch sind	2	5,4
6	Q21	Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten	2	5,4
7	Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	2	5,4
8	S06	Intrakranielle Verletzung	2	5,4
sonst.			15	40,5
<b>insg.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>37</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2017: Todesursachenstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

\*Anteil der Todesursache an allen  
Sterbefällen der Altersgruppe und  
des Geschlechts

**Indikator (L)  
3.56**

**Häufigste Todesursachen von Säuglingen, darunter plötzlicher Kindstod,  
nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2014**

Häufigste Todesursachen von Säuglingen: <b>weiblich</b>				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	3	17,7
2	Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	2	11,8
3	Q87	Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungssyndrome mit Beteiligung mehrerer Systeme	2	11,8
sonst.			10	58,8
<b>insg.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>17</b>	<b>100</b>
Häufigste Todesursachen von Säuglingen: <b>männlich</b>				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	4	16,0
2	P25	Interstitielles Emphysem und verwandte Zustände mit Ursprung in der Perinatalperiode	3	12,0
3	R95	Plötzlicher Kindstod	3	12,0
4	P02	Schädigung d. Feten u. Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur u. Eihäuten	2	8,0
5	P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	2	8,0
6	Q20	Angeborene Fehlbildungen der Herzhöhlen und verbindender Strukturen	2	8,0
7	T81	Komplikationen bei Eingriffen, a.n.k.	2	8,0
sonst.			7	28,0
<b>insg.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>25</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2016: Todesursachenstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

\*Anteil der Todesursache an allen  
Sterbefällen der Altersgruppe und  
des Geschlechts

**Indikator (L)  
3.56**

**Häufigste Todesursachen von Säuglingen, darunter plötzlicher Kindstod,  
nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2013**

Häufigste Todesursachen von Säuglingen: <b>weiblich</b>				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	R95	Plötzlicher Kindstod	3	16,7
2	S06	Intrakranielle Verletzung	2	11,1
sonst.			13	72,2
<b>insg.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>18</b>	<b>100</b>
Häufigste Todesursachen von Säuglingen: <b>männlich</b>				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	6	19,4
2	P28	Sonstige Störungen der Atmung mit Ursprung in der Perinatalperiode	3	9,7
3	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	2	6,5
4	Q90	Down-Syndrom	2	6,5
sonst.			18	58,1
<b>insg.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>31</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2015: Todesursachenstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

\*Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der Altersgruppe und des Geschlechts

**Indikator (L)  
3.56**

**Häufigste Todesursachen von Säuglingen, darunter plötzlicher Kindstod,  
nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2012**

Häufigste Todesursachen von Säuglingen: weiblich				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	3	14,3
2	P21	Asphyxie unter der Geburt	3	14,3
3	J12	Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert	2	9,5
4	P36	Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen	2	9,5
5	S06	Intrakranielle Verletzung	2	9,5
sonst.			9	42,9
<b>insg.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>21</b>	<b>100</b>
Häufigste Todesursachen von Säuglingen: männlich				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	4	13,3
2	J15	Pneumonie durch Bakterien, a.n.k.	2	6,7
3	P21	Asphyxie unter der Geburt	2	6,7
4	P36	Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen	2	6,7
5	Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	2	6,7
sonst.			18	60,0
<b>insg.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2015: Todesursachenstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

\*Anteil der Todesursache an allen  
Sterbefällen der Altersgruppe und  
des Geschlechts

**Indikator (L)  
3.56**

**Häufigste Todesursachen von Säuglingen, darunter plötzlicher Kindstod, nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2011**

Häufigste Todesursachen von Säuglingen: <b>weiblich</b>				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschafts-dauer u. niedrigem Geburtsgewicht, andernorts nicht klassifiziert	6	24,0
2	R95	Plötzlicher Kindstod	4	16,0
3	P25	Interstitielles Emphysem und verwandte Zustände mit Ursprung in der Perinatalperiode	2	8,0
4	P77	Enterocolitis necroticans beim Feten und Neugeborenen	2	8,0
sonst.			11	44,0
<b>insg.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>25</b>	<b>100</b>
Häufigste Todesursachen von Säuglingen: <b>männlich</b>				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	P25	Interstitielles Emphysem und verwandte Zustände mit Ursprung in der Perinatalperiode	3	11,5
2	P28	Sonstige Störungen der Atmung mit Ursprung in der Perinatalperiode	2	7,7
sonst.			21	80,8
<b>insg.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>26</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2012: Todesursachenstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

\*Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der Altersgruppe und des Geschlechts

Indikator (L)  
3.56

Häufigste Todesursachen von Säuglingen, darunter plötzlicher Kindstod, nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2010

Häufigste Todesursachen von Säuglingen: weiblich				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	P25	Interstitielles Emphysem und verwandte Zustände mit Ursprung in der Perinatalperiode	2	15,4
sonst.			11	84,6
<b>insg.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>13</b>	<b>100</b>
Häufigste Todesursachen von Säuglingen: männlich				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschafts-dauer u. niedrigem Geburtsgewicht, andernorts nicht klassifiziert	6	16,7
2	R95	Plötzlicher Kindstod	4	11,1
3	G12	Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome	2	5,6
4	P25	Interstitielles Emphysem und verwandte Zustände mit Ursprung in der Perinatalperiode	2	5,6
5	P29	Kardiovaskuläre Krankheiten mit Ursprung in der Perinatalperiode	2	5,6
6	P96	Sonstige Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	2	5,6
7	Q24	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens	2	5,6
8	Q79	Angeborene Fehlbildungen des Muskel-Skelett-Systems, andernorts nicht klassifiziert	2	5,6
9	Q90	Down-Syndrom	2	5,6
10	S06	Intrakranielle Verletzung	2	5,6
sonst.			10	27,8
<b>insg.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>36</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2012: Todesursachenstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

\*Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der Altersgruppe und des Geschlechts

Indikator (L)  
3.56

Häufigste Todesursachen von Säuglingen, darunter plötzlicher Kindstod, nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2009

Häufigste Todesursachen von Säuglingen: weiblich				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	4	20,0
2	P02	Schädigung d. Feten u. Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur u. Eihäuten	2	10,0
2	P52	Intrakranielle nichttraumatische Blutung beim Feten und Neugeborenen	2	10,0
2	Q24	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens	2	10,0
sonst.			10	50,0
<b>insg.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>20</b>	<b>100</b>
Häufigste Todesursachen von Säuglingen: männlich				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	T71	Erstickung	4	13,8
2	P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	3	10,3
2	R95	Plötzlicher Kindstod	3	10,3
4	J12	Viruspneumonie, andernorts nicht klassifiziert	2	6,9
4	P02	Schädigung d. Feten u. Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur u. Eihäuten	2	6,9
4	P28	Sonstige Störungen der Atmung mit Ursprung in der Perinatalperiode	2	6,9
sonst.			13	44,8
<b>insg.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>29</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2010: Todesursachenstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

\*Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der Altersgruppe und des Geschlechts

**Indikator (L)  
3.56**

**Häufigste Todesursachen von Säuglingen, darunter plötzlicher Kindstod, nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2008**

Häufigste Todesursachen von Säuglingen: weiblich				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	R95	Plötzlicher Kindstod	3	12,5
2	J12	Viruspneumonie, andernorts nicht klassifiziert	2	8,3
3	P02	Schädigung d. Feten u. Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur u. Eihäuten	2	8,3
4	T71	Erstickung	2	8,3
sonst.			15	62,5
<b>insg.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>24</b>	<b>100</b>
Häufigste Todesursachen von Säuglingen: männlich				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschafts-dauer u. niedrigem Geburtsgewicht, andernorts nicht klassifiziert	8	21,6
2	R95	Plötzlicher Kindstod	5	13,5
3	P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	2	5,4
4	P25	Interstitielles Emphysem u. verwandte Zustände mit Ursprung i. d. Perinatalperiode	2	5,4
sonst.			20	54,1
<b>insg.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>37</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2010: Todesursachenstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

\*Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der Altersgruppe und des Geschlechts

**Indikator (L)  
3.56**

**Häufigste Todesursachen von Säuglingen, darunter plötzlicher Kindstod, nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2007**

Häufigste Todesursachen von Säuglingen: weiblich				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	P21	Asphyxie unter der Geburt	4	16,7
2	J12	Viruspneumonie, andernorts nicht klassifiziert	3	12,5
3	P25	Interstitielles Emphysem u. verwandte Zustände mit Ursprung i. d. Perinatalperiode	2	8,3
	Q25	Angeborene Fehlbildung der großen Arterien	2	8,3
4	R95	Plötzlicher Kindstod	1	4,2
sonst.			12	50,0
<b>insg.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>24</b>	<b>100</b>
Häufigste Todesursachen von Säuglingen: männlich				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	P02	Schädigung d. Feten u. Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur u. Eihäuten	5	17,9
2	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschafts-dauer u. niedrigem Geburtsgewicht, andernorts nicht klassifiziert	3	10,7
	P52	Intrakranielle nichttraumatische Blutung bei Feten u. Neugeborenen	3	10,7
3	P25	Interstitielles Emphysem u. verwandte Zustände mit Ursprung i. d. Perinatalperiode	2	7,1
	P28	Sonstige Störung d. Atmung mit Ursprung i. d. Perinatalperiode	2	7,1
	P36	Bakterielle Sepsis bei Neugeborenen	2	7,1
	Q24	Sonstige angeborene Fehlbildung des Herzens	2	7,1
	R95	Plötzlicher Kindstod	–	–
sonst.			9	32,1
<b>insg.</b>	<b>A00 - T98</b>		<b>28</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2009: Todesursachenstatistik.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

\*Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der Altersgruppe und des Geschlechts

– genau Null

Indikator (L)  
3.56

Häufigste Todesursachen von Säuglingen, darunter plötzlicher Kindstod, nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2006

Häufigste Todesursachen von Säuglingen: weiblich				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschafts-dauer u. niedrigem Geburtsgewicht, andernorts nicht klassifiziert	4	11,8
2	J12	Viruspneumonie, andernorts nicht klassifiziert	3	8,8
	P52	Intrakranielle nichttraumatische Blutung beim Feten und Neugeborenen	3	8,8
3	R95	Plötzlicher Kindstod	1	2,9
sonst.			23	67,6
<b>insg.</b>			<b>34</b>	<b>100</b>
Häufigste Todesursachen von Säuglingen: männlich				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschafts-dauer u. niedrigem Geburtsgewicht, andernorts nicht klassifiziert	5	20,8
2	P21	Asphyxie unter der Geburt	3	12,5
	P52	Intrakranielle nichttraumatische Blutung beim Feten und Neugeborenen	3	12,5
3	R95	Plötzlicher Kindstod	2	8,3
sonst.			11	45,8
<b>insg.</b>			<b>24</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:  
Todesursachenstatistik

\*Anteil der Todesursache an allen  
Sterbefällen d. Altersgruppe

Indikator (L)  
3.56

Häufigste Todesursachen von Säuglingen, darunter plötzlicher Kindstod,  
nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2005

Häufigste Todesursachen von Säuglingen: weiblich				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschafts-dauer u. niedrigem Geburtsgewicht, andernorts nicht klassifiziert	5	17,9
2	P52	Intrakranielle nichttraumatische Blutung beim Feten und Neugeborenen	4	14,3
3	P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	3	10,7
	P36	Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen	3	10,7
4	P22	Atemnot beim Neugeborenen	2	7,1
	R95	Plötzlicher Kindstod	–	0,0
sonst.			11	39,3
<b>insg.</b>			<b>28</b>	<b>100</b>
Häufigste Todesursachen von Säuglingen: männlich				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschafts-dauer u. niedrigem Geburtsgewicht, andernorts nicht klassifiziert	4	16,0
2	P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	2	8,0
	P28	Sonst. Störungen d. Atmung mit Ursprung in der Perinatalperiode	2	8,0
	Q20	Angeborene Fehlbildung d. Herzhöhlen u. verbindender Strukturen	2	8,0
	R95	Plötzlicher Kindstod	–	0,0
sonst.			15	60,0
<b>insg.</b>			<b>25</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:  
Todesursachenstatistik

\*Anteil der Todesursache an allen  
Sterbefällen d. Altersgruppe

– nichts vorhanden, genau Null

Indikator (L)  
3.56

Häufigste Todesursachen von Säuglingen, darunter plötzlicher Kindstod,  
nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt, 2004

Häufigste Todesursachen von Säuglingen: weiblich				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschafts-dauer u. niedrigem Geburtsgewicht, andernorts nicht klassifiziert	10	31,3
2	R95	Plötzlicher Kindstod	3	9,4
3	P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	2	6,3
	S06	Intrakranielle Verletzung	2	6,3
sonst.			15	46,9
<b>insg.</b>			<b>32</b>	<b>100</b>
Häufigste Todesursachen von Säuglingen: männlich				
Rang	ICD-10	Diagnose	Anzahl	Anteil in %*
1	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschafts-dauer u. niedrigem Geburtsgewicht, andernorts nicht klassifiziert	10	26,3
2	Q23	Angeborene Fehler der Aorten- und der Mitralklappe	5	13,2
3	P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	4	10,5
4	R95	Plötzlicher Kindstod	3	7,9
	Q79	Angeborene Fehlbildungen des Muskel-Skelett-Systems, andernorts nicht klassifiziert	3	7,9
5	P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	2	5,3
	P28	Sonstige Störungen der Atmung mit Ursprung in der Perinatalperiode	2	5,3
	T71	Erstickung	2	5,3
sonst.			7	18,4
<b>insg.</b>			<b>38</b>	<b>100</b>

Datenquelle/Copyright:  
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt:  
Todesursachenstatistik

\*Anteil der Todesursache an allen  
Sterbefällen d. Altersgruppe