

**Indikator (L)
3.64**

Gemeldete gesicherte HIV-Erstdiagnosen nach Betroffenengruppen und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Diagnosejahre 2018–2023*

Betroffenengruppe	HIV-Erstdiagnosen																	
	2018			2019			2020			2021			2022			2023		
	männl.	weibl.	unbek.	männl.	weibl.	unbek.	männl.	weibl.	unbek.	männl.	weibl.	unbek.	männl.	weibl.	unbek.	männl.	weibl.	unbek.
	Anzahl*																	
MSM**	13	x	x	28	x	x	16	x	x	22	x	x	17	x	x	25	x	x
Konsumenten intravenös verabreichter Drogen (IVDA)	2	1	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	6	–	–	3	1	–
Bluterkrankte und Bluttransfusionsempfänger	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Heterosexuelle Kontakte	10	10	–	11	11	–	5	4	–	2	7	–	10	12	–	17	26	–
Prä- oder perinatale Infektion	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fehlende/keine Angaben zum Infektionsrisiko	13	3	–	15	3	–	12	2	–	7	1	–	11	2	–	21	6	–
Insgesamt	38	14	–	57	14	–	34	6	–	33	8	–	44	14	–	66	33	–

Datenquelle/Copyright:
AIDS-Zentrum in der Abt. für Infektionsepidemiologie
des Robert Koch-Instituts:
HIV-Meldungen nach § 7, Abs. 3 des IfSG

* Stand: 01.05.2024
** Männer, die Sex mit Männern haben
X Tabellenwert gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll
– genau null

**Indikator (L)
3.64**

**Gemeldete gesicherte HIV-Erstdiagnosen nach Betroffenengruppen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, Diagnosejahre 2010–2017**

Betroffenengruppe	HIV-Erstdiagnosen																							
	2010			2011			2012			2013			2014			2015			2016			2017		
	männl.	weibl.	unbek.	männl.	weibl.	unbek.	männl.	weibl.	unbek.	männl.	weibl.	unbek.	männl.	weibl.	unbek.	männl.	weibl.	unbek.	männl.	weibl.	unbek.	männl.	weibl.	unbek.
Anzahl*																								
MSM**	21	x	x	21	x	x	34	x	x	33	x	x	41	x	x	30	x	x	27	x	x	32	x	x
Konsumenten intravenös verabreichter Drogen (IVDA)	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	2	–	–	1	–	–	1	1	–
Bluterkrankte und Bluttransfusionsempfänger	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Heterosexuelle Kontakte	4	2	–	4	3	–	4	4	–	5	8	–	21	12	–	23	12	–	14	9	–	8	12	–
Prä- oder perinatale Infektion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Fehlende/keine Angaben zum Infektionsrisiko	6	–	–	12	1	–	10	1	1	19	1	–	8	–	–	13	1	–	13	–	1	6	2	–
Insgesamt	32	2	–	37	4	–	49	5	1	59	9	–	71	13	–	69	13	–	55	9	1	47	15	–

Datenquelle/Copyright:
AIDS-Zentrum in der Abt. für Infektionsepidemiologie
des Robert Koch-Instituts:
HIV-Meldungen nach § 7, Abs. 3 des IfSG

* Nachmeldungen möglich; Stand: 01.03.2018
** Männer, die Sex mit Männern haben
x Tabellenwert gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll
– genau null

**Indikator (L)
3.64**

**Gemeldete gesicherte HIV-Erstdiagnosen nach Betroffenengruppen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, Diagnosejahre 2005–2009**

Betroffenengruppe	HIV-Erstdiagnosen														
	2005			2006			2007			2008			2009		
	männl.	weibl.	unbek.	männl.	weibl.	unbek.	männl.	weibl.	unbek.	männl.	weibl.	unbek.	männl.	weibl.	unbek.
	Anzahl*														
MSM**	9	x	x	16	x	x	15	x	x	23	x	x	27	x	x
Konsumenten intravenös verabreichter Drogen (IVDA)	–	–	–	2	1	–	5	4	–	2	–	–	–	–	–
Bluterkrankte und Blut- transfusionsempfänger	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Heterosexuelle Kontakte	8	6	–	4	2	–	4	4	–	3	7	1	4	9	–
Prä- oder perinatale Infektion	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fehlende/keine Angaben zum Infektionsrisiko	4	3	–	8	2	–	12	2	–	7	–	–	7	–	–
Insgesamt	21	9	–	30	7	–	36	10	–	35	7	1	38	9	–

Datenquelle/Copyright:
AIDS-Zentrum in der Abt. für Infektionsepidemiologie
des Robert Koch-Instituts:
HIV-Meldungen nach § 7, Abs. 3 des IfSG

* Nachmeldungen möglich; Stand: März 2015
** Männer, die Sex mit Männern haben
X Tabellenwert gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll
– genau null

**Indikator (L)
3.64**

**Gemeldete gesicherte HIV-Erstdiagnosen nach Betroffenenengruppen und Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, Diagnosejahre 1995, 2000–2004**

Betroffenengruppe	HIV-Erstdiagnosen																	
	1995			2000			2001			2002			2003			2004		
	männl.	weibl.	unbek.	männl.	weibl.	unbek.	männl.	weibl.	unbek.	männl.	weibl.	unbek.	männl.	weibl.	unbek.	männl.	weibl.	unbek.
	Anzahl*																	
MSM**	2	x	x	5	x	x	7	x	x	4	x	x	5	x	x	8	x	x
Konsumenten intravenös verabreichter Drogen (IVDA)	–	–	–	2	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	2	–
Bluterkrankte und Blut- transfusionsempfänger	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Heterosexuelle Kontakte	5	1	–	7	14	–	5	4	–	10	16	–	12	11	–	3	5	–
Prä- oder perinatale Infektion	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Fehlende/keine Angaben zum Infektionsrisiko	2	1	–	3	–	1	–	2	–	3	–	–	4	–	–	4	1	–
Insgesamt	9	2	–	17	17	1	12	6	–	18	17	–	23	11	–	15	8	–

Datenquelle/Copyright:
AIDS-Zentrum in der Abt. für Infektionsepidemiologie
des Robert Koch-Instituts:
HIV-Meldungen nach § 7, Abs. 3 des IfSG

* Nachmeldungen möglich; Stand: März 2015
** Männer, die Sex mit Männern haben
X Tabellenwert gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll
– genau null