

**Indikator (L)
3.76**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter
bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2024**

| Diagnose | ICD-10 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---|----------|---|-----------|------------------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 weibl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 männl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 aktiv Versicherte |
| Bösartige Neubildungen | C00 - C97 | 453 | 85,3 | 509 | 89,2 | 962 | 87,3 |
| darunter: | | | | | | | |
| Lippe, Mundhöhle und Rachen | C00 - C14 | 15 | 2,8 | 67 | 11,7 | 82 | 7,4 |
| Magen | C16 | 6 | 1,1 | 19 | 3,3 | 25 | 2,3 |
| Dick-/Mastdarm | C18 - C21 | 46 | 8,7 | 77 | 13,5 | 123 | 11,2 |
| Bauchspeicheldrüse | C25 | 19 | 3,6 | 30 | 5,3 | 49 | 4,4 |
| Lunge | C33 - C34 | 64 | 12,1 | 70 | 12,3 | 134 | 12,2 |
| Melanom | C43 | 4 | 0,8 | 9 | 1,6 | 13 | 1,2 |
| Brustdrüse | C50 | 123 | 23,2 | • | • | • | • |
| Gebärmutterhals | C53 | 18 | 3,4 | X | X | X | X |
| Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe | C81 - C96 | 32 | 6,0 | 46 | 8,1 | 78 | 7,1 |

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (L)
3.76**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter
bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2023**

| Diagnose | ICD-10 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---|----------|---|-----------|------------------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 weibl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 männl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 aktiv Versicherte |
| Bösartige Neubildungen | C00 - C97 | 427 | 80,1 | 438 | 76,9 | 865 | 78,4 |
| darunter: | | | | | | | |
| Lippe, Mundhöhle und Rachen | C00 - C14 | 16 | 3,0 | 47 | 8,3 | 63 | 5,7 |
| Magen | C16 | 5 | 0,9 | 18 | 3,2 | 23 | 2,1 |
| Dick-/Mastdarm | C18 - C21 | 35 | 6,6 | 56 | 9,8 | 91 | 8,3 |
| Bauchspeicheldrüse | C25 | 16 | 3,0 | 20 | 3,5 | 36 | 3,3 |
| Lunge | C33 - C34 | 66 | 12,4 | 80 | 14,0 | 146 | 13,2 |
| Melanom | C43 | 9 | 1,7 | 8 | 1,4 | 17 | 1,5 |
| Brustdrüse | C50 | 123 | 23,1 | • | • | • | • |
| Gebärmutterhals | C53 | 16 | 3,0 | X | X | X | X |
| Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe | C81 - C96 | 34 | 6,4 | 29 | 5,1 | 63 | 5,7 |

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (L)
3.76**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter
bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2022**

| Diagnose | ICD-10 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|---|----------|---|-----------|------------------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 weibl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 männl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 aktiv Versicherte |
| Bösartige Neubildungen | C00 - C97 | 413 | 77,1 | 428 | 75,3 | 841 | 76,2 |
| darunter: | | | | | | | |
| Lippe, Mundhöhle und Rachen | C00 - C14 | 5 | 0,9 | 52 | 9,1 | 57 | 5,2 |
| Magen | C16 | 10 | 1,9 | 11 | 1,9 | 21 | 1,9 |
| Dick-/Mastdarm | C18 - C21 | 34 | 6,3 | 71 | 12,5 | 105 | 9,5 |
| Bauchspeicheldrüse | C25 | 24 | 4,5 | 15 | 2,6 | 39 | 3,5 |
| Lunge | C33 - C34 | 44 | 8,2 | 69 | 12,1 | 113 | 10,2 |
| Melanom | C43 | 11 | 2,1 | 5 | 0,9 | 16 | 1,4 |
| Brustdrüse | C50 | 118 | 22,0 | – | – | 118 | 10,7 |
| Gebärmutterhals | C53 | 6 | 1,1 | X | X | X | X |
| Lymphat. u. blut-bildendes Gewebe | C81 - C96 | 38 | 7,1 | 42 | 7,4 | 80 | 7,2 |

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (L)
3.76**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter
bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2021**

| Diagnose | ICD-10 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|---|----------|---|-----------|------------------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 weibl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 männl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 aktiv Versicherte |
| Bösartige Neubildungen | C00 - C97 | 386 | 73,0 | 549 | 96,9 | 935 | 85,3 |
| darunter: | | | | | | | |
| Lippe, Mundhöhle und Rachen | C00 - C14 | 9 | 1,7 | 60 | 10,6 | 69 | 6,3 |
| Magen | C16 | 11 | 2,1 | 23 | 4,1 | 34 | 3,1 |
| Dick-/Mastdarm | C18 - C21 | 38 | 7,2 | 66 | 11,6 | 104 | 9,5 |
| Bauchspeicheldrüse | C25 | 14 | 2,6 | 17 | 3,0 | 31 | 2,8 |
| Lunge | C33 - C34 | 61 | 11,5 | 110 | 19,4 | 171 | 15,6 |
| Melanom | C43 | 5 | 0,9 | 7 | 1,2 | 12 | 1,1 |
| Brustdrüse | C50 | 105 | 19,8 | 4 | 0,7 | 109 | 9,9 |
| Gebärmutterhals | C53 | 11 | 2,1 | X | X | X | X |
| Lymphat. u. blut-bildendes Gewebe | C81 - C96 | 36 | 6,8 | 42 | 7,4 | 78 | 7,1 |

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll

Indikator (L)
3.76

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter
bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2020**

| Diagnose | ICD-10 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--|---|----------|---|-----------|------------------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 weibl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 männl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 aktiv Versicherte |
| Bösartige Neubildungen | C00 - C97 | 476 | 89,0 | 487 | 85,3 | 963 | 87,1 |
| darunter: | | | | | | | |
| Lippe, Mundhöhle und Rachen | C00 - C14 | 16 | 3,0 | 54 | 9,5 | 70 | 6,3 |
| Magen | C16 | 13 | 2,4 | 18 | 3,2 | 31 | 2,8 |
| Dick-/Mastdarm | C18 - C21 | 43 | 8,0 | 62 | 10,9 | 105 | 9,5 |
| Bauchspeicheldrüse | C25 | 17 | 3,2 | 20 | 3,5 | 37 | 3,3 |
| Lunge | C33 - C34 | 62 | 11,6 | 92 | 16,1 | 154 | 13,9 |
| Melanom | C43 | 10 | 1,9 | 6 | 1,1 | 16 | 1,4 |
| Brustdrüse | C50 | 123 | 23,0 | 1 | 0,2 | 124 | 11,2 |
| Gebärmutterhals | C53 | 9 | 1,7 | X | X | X | X |
| Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe | C81 - C96 | 31 | 5,8 | 51 | 8,9 | 82 | 7,4 |

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (L)
3.76**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter
bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2019**

| Diagnose | ICD-10 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---|----------|---|-----------|------------------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 weibl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 männl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 aktiv Versicherte |
| Bösartige Neubildungen | C00 - C97 | 419 | 77,4 | 430 | 74,7 | 849 | 76,0 |
| darunter: | | | | | | | |
| Lippe, Mundhöhle und Rachen | C00 - C14 | 8 | 1,5 | 55 | 9,6 | 63 | 5,6 |
| Magen | C16 | 6 | 1,1 | 17 | 3,0 | 23 | 2,1 |
| Dick-/Mastdarm | C18 - C21 | 35 | 6,5 | 61 | 10,6 | 96 | 8,6 |
| Bauchspeicheldrüse | C25 | 22 | 4,1 | 18 | 3,1 | 40 | 3,6 |
| Lunge | C33 - C34 | 61 | 11,3 | 65 | 11,3 | 126 | 11,3 |
| Melanom | C43 | 13 | 2,4 | 1 | 0,2 | 14 | 1,3 |
| Brustdrüse | C50 | 115 | 21,2 | – | – | 115 | 10,3 |
| Gebärmutterhals | C53 | 11 | 2,0 | X | X | X | X |
| Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe | C81 - C96 | 41 | 7,6 | 51 | 8,9 | 92 | 8,2 |

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (L)
3.76**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter
bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2018**

| Diagnose | ICD-10 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--|---|----------|---|-----------|------------------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 weibl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 männl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 aktiv Versicherte |
| Bösartige Neubildungen | C00 - C97 | 364 | 68,1 | 473 | 83,6 | 837 | 76,1 |
| darunter: | | | | | | | |
| Lippe, Mundhöhle und Rachen | C00 - C14 | 19 | 3,6 | 53 | 9,4 | 72 | 6,5 |
| Magen | C16 | 8 | 1,5 | 18 | 3,2 | 26 | 2,4 |
| Dick-/Mastdarm | C18 - C21 | 35 | 6,6 | 65 | 11,5 | 100 | 9,1 |
| Bauchspeicheldrüse | C25 | 10 | 1,9 | 19 | 3,4 | 29 | 2,6 |
| Lunge | C33 - C34 | 46 | 8,6 | 88 | 15,6 | 134 | 12,2 |
| Melanom | C43 | 4 | 0,7 | 3 | 0,5 | 7 | 0,6 |
| Brustdrüse | C50 | 112 | 21,0 | – | – | 112 | 10,2 |
| Gebärmutterhals | C53 | 15 | 2,8 | X | X | X | X |
| Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe | C81 - C96 | 27 | 5,1 | 45 | 8,0 | 72 | 6,5 |

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (L)
3.76**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter
bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2017**

| Diagnose | ICD-10 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|---|----------|---|-----------|------------------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 weibl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 männl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 aktiv Versicherte |
| Bösartige Neubildungen | C00 - C97 | 330 | 61,9 | 427 | 75,7 | 757 | 69,0 |
| darunter: | | | | | | | |
| Lippe, Mundhöhle und Rachen | C00 - C14 | 12 | 2,3 | 48 | 8,5 | 60 | 5,5 |
| Magen | C16 | 10 | 1,9 | 23 | 4,1 | 33 | 3,0 |
| Dick-/Mastdarm | C18 - C21 | 22 | 4,1 | 51 | 9,0 | 73 | 6,7 |
| Bauchspeicheldrüse | C25 | 9 | 1,7 | 24 | 4,3 | 33 | 3,0 |
| Lunge | C33 - C34 | 42 | 7,9 | 78 | 13,8 | 120 | 10,9 |
| Melanom | C43 | 3 | 0,6 | 5 | 0,9 | 8 | 0,7 |
| Brustdrüse | C50 | 95 | 17,8 | – | – | 95 | 8,7 |
| Gebärmutterhals | C53 | 12 | 2,3 | x | x | x | x |
| Lymphat. u. blut-bildendes Gewebe | C81 - C96 | 29 | 5,4 | 48 | 8,5 | 77 | 7,0 |

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (L)
3.76**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter
bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2016**

| Diagnose | ICD-10 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---|----------|---|-----------|------------------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 weibl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 männl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 aktiv Versicherte |
| Bösartige Neubildungen | C00 - C97 | 391 | 73,0 | 509 | 89,9 | 900 | 81,7 |
| darunter: | | | | | | | |
| Lippe, Mundhöhle und Rachen | C00 - C14 | 8 | 1,5 | 56 | 9,9 | 64 | 5,8 |
| Magen | C16 | 8 | 1,5 | 27 | 4,8 | 35 | 3,2 |
| Dick-/Mastdarm | C18 - C21 | 44 | 8,2 | 71 | 12,5 | 115 | 10,4 |
| Bauchspeicheldrüse | C25 | 14 | 2,6 | 28 | 4,9 | 42 | 3,8 |
| Lunge | C33 - C34 | 44 | 8,2 | 101 | 17,8 | 145 | 13,2 |
| Melanom | C43 | 4 | 0,7 | 4 | 0,7 | 8 | 0,7 |
| Brustdrüse | C50 | 114 | 21,3 | – | – | 114 | 10,3 |
| Gebärmutterhals | C53 | 17 | 3,2 | x | x | x | x |
| Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe | C81 - C96 | 33 | 6,2 | 28 | 4,9 | 61 | 5,5 |

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll

Indikator (L)
3.76

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter
bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2015**

| Diagnose | ICD-10 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--|---|----------|---|-----------|------------------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 weibl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 männl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 aktiv Versicherte |
| Bösartige Neubildungen | C00 - C97 | 400 | 74,6 | 531 | 94,1 | 931 | 84,6 |
| darunter: | | | | | | | |
| Lippe, Mundhöhle und Rachen | C00 - C14 | 25 | 4,7 | 73 | 12,9 | 98 | 8,9 |
| Magen | C16 | 8 | 1,5 | 23 | 4,1 | 31 | 2,8 |
| Dick-/Mastdarm | C18 - C21 | 33 | 6,2 | 62 | 11,0 | 95 | 8,6 |
| Bauchspeicheldrüse | C25 | 9 | 1,7 | 17 | 3,0 | 26 | 2,4 |
| Lunge | C33 - C34 | 49 | 9,1 | 120 | 21,3 | 169 | 15,4 |
| Melanom | C43 | 6 | 1,1 | 5 | 0,9 | 11 | 1,0 |
| Brustdrüse | C50 | 108 | 20,1 | – | – | 108 | 9,8 |
| Gebärmutterhals | C53 | 11 | 2,1 | x | x | x | x |
| Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe | C81 - C96 | 33 | 6,2 | 38 | 6,7 | 71 | 6,5 |

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (L)
3.76**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter
bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2014**

| Diagnose | ICD-10 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---|----------|---|-----------|------------------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 weibl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 männl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 aktiv Versicherte |
| Bösartige Neubildungen | C00 - C97 | 367 | 67,9 | 498 | 86,8 | 865 | 77,6 |
| darunter: | | | | | | | |
| Lippe, Mundhöhle und Rachen | C00 - C14 | 17 | 3,1 | 71 | 12,4 | 88 | 7,9 |
| Magen | C16 | 18 | 3,3 | 21 | 3,7 | 39 | 3,5 |
| Dick-/Mastdarm | C18 - C21 | 25 | 4,6 | 64 | 11,2 | 89 | 8,0 |
| Bauchspeicheldrüse | C25 | 14 | 2,6 | 14 | 2,4 | 28 | 2,5 |
| Lunge | C33 - C34 | 52 | 9,6 | 109 | 19,0 | 161 | 14,5 |
| Melanom | C43 | 7 | 1,3 | 3 | 0,5 | 10 | 0,9 |
| Brustdrüse | C50 | 100 | 18,5 | • | • | 101 | 9,1 |
| Gebärmutterhals | C53 | 16 | 3,0 | x | x | x | x |
| Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe | C81 - C96 | 28 | 5,2 | 39 | 6,8 | 67 | 6,0 |

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
• Zahlenwert unbekannt
oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.76**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter
bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2013**

| Diagnose | ICD-10 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|---|----------|---|-----------|------------------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 weibl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 männl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 aktiv Versicherte |
| Bösartige Neubildungen | C00 - C97 | 403 | 74,4 | 498 | 86,0 | 901 | 80,4 |
| darunter: | | | | | | | |
| Lippe, Mundhöhle und Rachen | C00 - C14 | 11 | 2,0 | 63 | 10,9 | 74 | 6,6 |
| Magen | C16 | 13 | 2,4 | 21 | 3,6 | 34 | 3,0 |
| Dick-/Mastdarm | C18 - C21 | 35 | 6,5 | 63 | 10,9 | 98 | 8,7 |
| Bauchspeicheldrüse | C25 | 13 | 2,4 | 19 | 3,3 | 32 | 2,9 |
| Lunge | C33 - C34 | 47 | 8,7 | 106 | 18,3 | 153 | 13,6 |
| Melanom | C43 | 4 | 0,7 | 5 | 0,9 | 9 | 0,8 |
| Brustdrüse | C50 | 119 | 22,0 | • | • | 121 | 10,8 |
| Gebärmutterhals | C53 | 17 | 3,1 | X | X | X | X |
| Lymphat. u. blut-bildendes Gewebe | C81 - C96 | 34 | 6,3 | 45 | 7,8 | 79 | 7,0 |

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
• Zahlenwert unbekannt
oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.76**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter
bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2012**

| Diagnose | ICD-10 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|---|----------|---|-----------|------------------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 weibl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 männl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 aktiv Versicherte |
| Bösartige Neubildungen | C00 - C97 | 437 | 80,1 | 567 | 97,1 | 1.004 | 88,9 |
| darunter: | | | | | | | |
| Lippe, Mundhöhle und Rachen | C00 - C14 | 13 | 2,4 | 70 | 12,0 | 83 | 7,3 |
| Magen | C16 | 14 | 2,6 | 34 | 5,8 | 48 | 4,2 |
| Dick-/Mastdarm | C18 - C21 | 41 | 7,5 | 70 | 12,0 | 111 | 9,8 |
| Bauchspeicheldrüse | C25 | 19 | 3,5 | 19 | 3,3 | 38 | 3,4 |
| Lunge | C33 - C34 | 38 | 7,0 | 109 | 18,7 | 147 | 13,0 |
| Melanom | C43 | 7 | 1,3 | 4 | 0,7 | 11 | 1,0 |
| Brustdrüse | C50 | 121 | 22,2 | • | • | 123 | 10,9 |
| Gebärmutterhals | C53 | 21 | 3,8 | X | X | X | X |
| Lymphat. u. blut-bildendes Gewebe | C81 - C96 | 33 | 6,0 | 56 | 9,6 | 89 | 7,9 |

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
• Zahlenwert unbekannt
oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.76**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter
bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2011**

| Diagnose | ICD-10 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|---|----------|---|-----------|------------------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 weibl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 männl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 aktiv Versicherte |
| Bösartige Neubildungen | C00 - C97 | 460 | 82,9 | 529 | 89,2 | 989 | 86,1 |
| darunter: | | | | | | | |
| Lippe, Mundhöhle und Rachen | C00 - C14 | 14 | 2,5 | 68 | 11,5 | 82 | 7,1 |
| Magen | C16 | 15 | 2,7 | 34 | 5,7 | 49 | 4,3 |
| Dick-/Mastdarm | C18 - C21 | 46 | 8,3 | 73 | 12,3 | 119 | 10,4 |
| Bauchspeicheldrüse | C25 | 20 | 3,6 | 13 | 2,2 | 33 | 2,9 |
| Lunge | C33 - C34 | 52 | 9,4 | 106 | 17,9 | 158 | 13,8 |
| Melanom | C43 | • | • | 10 | 1,7 | 12 | 1,0 |
| Brustdrüse | C50 | 125 | 22,5 | • | • | 127 | 11,1 |
| Gebärmutterhals | C53 | 25 | 4,5 | X | X | X | X |
| Lymphat. u. blut-bildendes Gewebe | C81 - C96 | 36 | 6,5 | 36 | 6,1 | 72 | 6,3 |

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
• Zahlenwert unbekannt
oder geheim zu halten

Indikator (L)
3.76

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter
bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2010**

| Diagnose | ICD-10 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---|----------|---|-----------|------------------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 weibl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 männl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 aktiv Versicherte |
| Bösartige Neubildungen | C00 - C97 | 499 | 88,5 | 563 | 93,5 | 1.062 | 91,1 |
| darunter: | | | | | | | |
| Lippe, Mundhöhle und Rachen | C00 - C14 | 13 | 2,3 | 63 | 10,5 | 76 | 6,5 |
| Magen | C16 | 18 | 3,2 | 33 | 5,5 | 51 | 4,4 |
| Dick-/Mastdarm | C18 - C21 | 53 | 9,4 | 78 | 13,0 | 131 | 11,2 |
| Bauchspeicheldrüse | C25 | 11 | 2,0 | 22 | 3,7 | 33 | 2,8 |
| Lunge | C33 - C34 | 43 | 7,6 | 85 | 14,1 | 128 | 11,0 |
| Melanom | C43 | • | • | 4 | 0,7 | 5 | 0,4 |
| Brustdrüse | C50 | 160 | 28,4 | • | • | 162 | 13,9 |
| Gebärmutterhals | C53 | 22 | 3,9 | X | X | X | X |
| Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe | C81 - C96 | 43 | 7,6 | 54 | 9,0 | 97 | 8,3 |

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
• Zahlenwert unbekannt
oder geheim zu halten

Indikator (L)
3.76

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter
bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2009**

| Diagnose | ICD-10 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---|----------|---|-----------|------------------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 weibl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 männl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 aktiv Versicherte |
| Bösartige Neubildungen | C00 - C97 | 492 | 86,0 | 666 | 108,7 | 1.158 | 97,7 |
| darunter: | | | | | | | |
| Lippe, Mundhöhle und Rachen | C00 - C14 | 23 | 4,0 | 88 | 14,4 | 111 | 9,4 |
| Magen | C16 | 17 | 3,0 | 42 | 6,9 | 59 | 5,0 |
| Dick-/Mastdarm | C18 - C21 | 39 | 6,8 | 93 | 15,2 | 132 | 11,1 |
| Bauchspeicheldrüse | C25 | 10 | 1,7 | 18 | 2,9 | 28 | 2,4 |
| Lunge | C33 - C34 | 38 | 6,6 | 111 | 18,1 | 149 | 12,6 |
| Melanom | C43 | 9 | 1,6 | 5 | 0,8 | 14 | 1,2 |
| Brustdrüse | C50 | 159 | 27,8 | 3 | 0,5 | 162 | 13,7 |
| Gebärmutterhals | C53 | 25 | 4,4 | X | X | X | X |
| Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe | C81 - C96 | 39 | 6,8 | 68 | 11,1 | 107 | 9,0 |

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

- genau null
- x Aussage nicht sinnvoll
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Indikator (L)
3.76

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter
bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2008**

| Diagnose | ICD-10 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---|----------|---|-----------|------------------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 weibl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 männl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 aktiv Versicherte |
| Bösartige Neubildungen | C00 - C97 | 445 | 76,2 | 522 | 83,8 | 967 | 80,1 |
| darunter: | | | | | | | |
| Lippe, Mundhöhle und Rachen | C00 - C14 | 12 | 2,1 | 67 | 10,8 | 79 | 6,5 |
| Magen | C16 | 7 | 1,2 | 31 | 5,0 | 38 | 3,1 |
| Dick-/Mastdarm | C18 - C21 | 53 | 9,1 | 66 | 10,6 | 119 | 9,9 |
| Bauchspeicheldrüse | C25 | 9 | 1,5 | 17 | 2,7 | 26 | 2,2 |
| Lunge | C33 - C34 | 36 | 6,2 | 96 | 15,4 | 132 | 10,9 |
| Melanom | C43 | 7 | 1,2 | 5 | 0,8 | 12 | 1,0 |
| Brustdrüse | C50 | 135 | 23,1 | – | 0,0 | 135 | 11,2 |
| Gebärmutterhals | C53 | 17 | 2,9 | X | X | X | X |
| Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe | C81 - C96 | 41 | 7,0 | 44 | 7,1 | 85 | 7,0 |

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
• Zahlenwert unbekannt
oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.76**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter
bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2007**

| Diagnose | ICD-10 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---|----------|---|-----------|------------------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 weibl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 männl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 aktiv Versicherte |
| Bösartige Neubildungen | C00 - C97 | 470 | 79,2 | 544 | 86,0 | 1.014 | 82,7 |
| darunter: | | | | | | | |
| Lippe, Mundhöhle und Rachen | C00 - C14 | 17 | 2,9 | 75 | 11,9 | 92 | 7,5 |
| Magen | C16 | 20 | 3,4 | 28 | 4,4 | 48 | 3,9 |
| Dick-/Mastdarm | C18 - C21 | 34 | 5,7 | 81 | 12,8 | 115 | 9,4 |
| Bauchspeicheldrüse | C25 | 12 | 2,0 | 25 | 4,0 | 37 | 3,0 |
| Lunge | C33 - C34 | 27 | 4,6 | 101 | 16,0 | 128 | 10,4 |
| Melanom | C43 | 5 | 0,8 | 8 | 1,3 | 13 | 1,1 |
| Brustdrüse | C50 | 162 | 27,3 | • | • | 163 | 13,3 |
| Gebärmutterhals | C53 | 28 | 4,7 | X | X | X | X |
| Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe | C81 - C96 | 30 | 5,1 | 43 | 6,8 | 73 | 6,0 |

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
• Zahlenwert unbekannt
oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.76**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter
bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2006**

| Diagnose | ICD-10 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---|----------|---|-----------|------------------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 weibl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 männl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 aktiv Versicherte |
| Bösartige Neubildungen | C00 - C97 | 506 | 84,9 | 500 | 78,1 | 1.006 | 81,3 |
| darunter: | | | | | | | |
| Lippe, Mundhöhle und Rachen | C00 - C14 | 15 | 2,5 | 64 | 10,0 | 79 | 6,4 |
| Magen | C16 | 14 | 2,3 | 28 | 4,4 | 42 | 3,4 |
| Dick-/Mastdarm | C18 - C21 | 52 | 8,7 | 64 | 10,0 | 116 | 9,4 |
| Bauchspeicheldrüse | C25 | 15 | 2,5 | 21 | 3,3 | 36 | 2,9 |
| Lunge | C33 - C34 | 44 | 7,4 | 95 | 14,8 | 139 | 11,2 |
| Melanom | C43 | 12 | 2,0 | 5 | 0,8 | 17 | 1,4 |
| Brustdrüse | C50 | 147 | 24,7 | – | 0,0 | 147 | 11,9 |
| Gebärmutterhals | C53 | 34 | 5,7 | X | X | X | X |
| Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe | C81 - C96 | 53 | 8,9 | 50 | 7,8 | 103 | 8,3 |

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
• Zahlenwert unbekannt
oder geheim zu halten

**Indikator (L)
3.76**

**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter
bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2005**

| Diagnose | ICD-10 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge bösartiger Neubildungen | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---|----------|---|-----------|------------------------------------|
| | | weiblich | | männlich | | insgesamt | |
| | | Anzahl | je 100 000 weibl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 männl. aktiv Versicherte | Anzahl | je 100 000 aktiv Versicherte |
| Bösartige Neubildungen | C00 - C97 | 509 | 85,3 | 576 | 89,5 | 1.085 | 87,5 |
| darunter: | | | | | | | |
| Lippe, Mundhöhle und Rachen | C00 - C14 | 12 | 2,0 | 64 | 9,9 | 76 | 6,1 |
| Magen | C16 | 34 | 5,7 | 38 | 5,9 | 72 | 5,8 |
| Dick-/Mastdarm | C18 - C21 | 36 | 6,0 | 65 | 10,1 | 101 | 8,1 |
| Bauchspeicheldrüse | C25 | 15 | 2,5 | 26 | 4,0 | 41 | 3,3 |
| Lunge | C33 - C34 | 28 | 4,7 | 103 | 16,0 | 131 | 10,6 |
| Melanom | C43 | 10 | 1,7 | 12 | 1,9 | 22 | 1,8 |
| Brustdrüse | C50 | 166 | 27,8 | • | • | 167 | 13,5 |
| Gebärmutterhals | C53 | 20 | 3,4 | X | X | X | X |
| Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe | C81 - C96 | 58 | 9,7 | 57 | 8,9 | 115 | 9,3 |

Datenquelle/Copyright:
Deutsche Rentenversicherung Bund:
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung
und Statistik der Versicherten

– genau null
x Aussage nicht sinnvoll
• Zahlenwert unbekannt
oder geheim zu halten