

**Indikator (K)
3.77**

**Gestorbene infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2015**

Diagnose	ICD-10	Gestorbene infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einwohner
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	3.595	315,6	4.577	415,6	8.172	364,7
darunter:							
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	430	37,7	509	46,2	939	41,9
Lunge	C33 - C34	438	38,5	1.091	99,1	1.529	68,2
Melanom	C43	32	2,8	44	4,0	76	3,4
Brust	C50	532	46,7	8	0,7	540	24,1
Prostata	C61	X	X	528	48,0	X	X
Hirntumoren	C70 -C72	97	8,5	117	10,6	214	9,6
Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe	C81 - C96	347	30,5	419	38,1	766	34,2
standard. an Europabev. alt	C00 - C97		131,7		227,9		172,9

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2016:
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittl. Bevölkerung
x Tabellenwert gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (K)
3.77**

**Gestorbene infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2014**

Diagnose	ICD-10	Gestorbene infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einwohner
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	3.533	309,1	4.579	417,3	8.112	362,1
darunter:							
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	424	37,1	507	46,2	931	41,6
Lunge	C33 - C34	420	36,8	1.099	100,2	1.519	67,8
Melanom	C43	36	3,2	51	4,6	87	3,9
Brust	C50	531	46,5	9	0,8	540	24,1
Prostata	C61	X	X	496	45,2	X	X
Hirntumoren	C70 -C72	101	8,9	107	9,8	208	9,2
Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe	C81 - C96	349	30,5	378	34,5	727	32,5
standard. an Europabev. alt	C00 - C97		126,1		232,0		171,3

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Bundesamt, 2016:
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittl. Bevölkerung
x Tabellenwert gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (K)
3.77**

**Gestorbene infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2013**

Diagnose	ICD-10	Gestorbene infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einwohner
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	3.524	306,4	4.638	421,0	8.162	362,4
darunter:							
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	415	36,1	556	50,5	971	43,1
Lunge	C33 - C34	414	36,0	1.181	107,2	1.595	70,8
Melanom	C43	41	3,6	63	5,7	104	4,6
Brust	C50	540	46,9	4	0,4	544	24,2
Prostata	C61	X	X	516	46,8	X	X
Hirntumoren	C70 -C72	109	9,5	89	8,1	198	8,8
Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe	C81 - C96	347	30,2	405	36,8	752	33,4
standard. an Europabev. alt	C00 - C97		132,2		239,6		177,3

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Bundesamt, 2016:
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittl. Bevölkerung
x Tabellenwert gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (K)
3.77**

**Gestorbene infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2012**

Diagnose	ICD-10	Gestorbene infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einwohner
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	3.472	299,5	4.416	398,3	7.888	347,8
darunter:							
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	392	33,8	530	47,8	922	40,7
Lunge	C33 - C34	405	34,9	1.089	98,2	1.494	65,9
Melanom	C43	41	3,5	46	4,1	87	3,8
Brust	C50	540	46,6	5	0,5	545	24,0
Prostata	C61	X	X	484	43,7	X	X
Hirntumoren	C70 -C72	70	6,1	98	8,8	168	7,4
Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe	C81 - C96	326	28,1	343	30,9	669	29,5
standard. an Europabev. alt	C00 - C97		131,8		232,4		174,3

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Bundesamt, 2016:
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittl. Bevölkerung
x Tabellenwert gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (K)
3.77**

**Gestorbene infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2011¹⁾**

Diagnose	ICD-10	Gestorbene infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einwohner
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	3.511	296,3	4.485	393,8	7.996	344,0
darunter:							
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	441	37,2	496	43,6	937	40,3
Lunge	C33 - C34	401	33,8	1.126	98,9	1.527	65,7
Melanom	C43	43	3,6	57	5,0	100	4,3
Brust	C50	578	48,8	6	0,5	584	25,1
Prostata	C61	x	x	495	43,5	x	x
Hirntumoren	C70 -C72	83	7,0	106	9,3	189	8,1
Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe	C81 - C96	306	25,8	351	30,8	657	28,3
standard. an Europabev. alt	C00 - C97		132,0		237,1		175,8

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2012:
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittl. Bevölkerung
x Tabellenwert gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (K)
3.77**

**Gestorbene infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2010¹⁾**

Diagnose	ICD-10	Gestorbene infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einwohner
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	3.553	296,9	4.537	394,9	8.090	344,9
darunter:							
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	465	38,9	531	46,2	996	42,5
Lunge	C33 - C34	382	31,9	1.133	98,6	1.515	64,6
Melanom	C43	34	2,8	36	3,1	70	3,0
Brust	C50	558	46,6	5	0,4	563	24,0
Prostata	C61	x	x	491	42,7	x	x
Hirntumoren	C70 -C72	96	8,0	102	8,9	198	8,4
Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe	C81 - C96	327	27,3	342	29,8	669	28,5
standard. an Europabev. alt	C00 - C97		135,3		245,7		180,9

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2012:
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittl. Bevölkerung
x Tabellenwert gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (K)
3.77**

**Gestorbene infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2009¹⁾**

Diagnose	ICD-10	Gestorbene infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einwohner
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	3 425	283,2	4 414	380,6	7 839	330,9
darunter:							
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	441	36,5	558	48,1	999	42,2
Lunge	C33 - C34	359	29,7	1 075	92,7	1 434	60,5
Melanom	C43	32	2,7	43	3,7	75	3,2
Brust	C50	482	39,9	7	0,6	489	20,6
Prostata	C61	x	x	476	41,0	x	x
Hirntumoren	C70 -C72	85	7,0	117	10,1	202	8,5
Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe	C81 - C96	306	25,3	305	26,3	611	25,8
standard. an Europabev. alt	C00 - C97		130,8		245,2		177,7

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2010:
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittl. Bevölkerung
x Tabellenwert gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (K)
3.77**

**Gestorbene infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2008¹⁾**

Diagnose	ICD-10	Gestorbene infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einwohner
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	3.420	279,3	4.301	366,7	7.721	322,1
darunter:							
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	449	36,7	509	43,4	958	40,0
Lunge	C33 - C34	376	30,7	1 109	94,6	1 485	62,0
Melanom	C43	34	2,8	31	2,6	65	2,7
Brust	C50	483	39,5	5	0,4	488	20,4
Prostata	C61	x	x	398	33,9	x	x
Hirntumoren	C70 -C72	91	7,4	103	8,8	194	8,1
Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe	C81 - C96	281	23,0	333	28,4	614	25,6
standard. an Europabev. alt	C00 - C97		134,4		244,1		179,6

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2010:
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittl. Bevölkerung
x Tabellenwert gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (K)
3.77**

**Gestorbene infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2007¹⁾**

Diagnose	ICD-10	Gestorbene infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einwohner
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	3.278	264,3	4.268	359,6	7.546	310,9
darunter:							
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	434	35,0	505	42,6	931	38,4
Lunge	C33 - C34	375	30,2	1.179	99,4	1.554	64,0
Melanom	C43	25	2,0	38	3,2	63	2,6
Brust	C50	487	39,3	4	0,3	491	20,2
Prostata	C61	x	x	415	35,0	x	x
Hirntumoren	C70 -C72	75	6,0	87	7,3	162	6,7
Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe	C81 - C96	286	23,1	298	25,1	584	24,1
standard. an Europabev. alt	C00 - C97		128,2		246,9		175,9

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2009
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,

¹⁾ vereinfachte Berechnung der durchschnittl. Bevölkerung
x Tabellenwert gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (K)
3.77**

**Gestorbene infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2006**

Diagnose	ICD-10	Gestorbene infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einwohner
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	3.277	260,9	4.060	338,5	7.337	298,8
darunter:							
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	446	35,5	476	39,7	922	37,5
Lunge	C33 - C34	363	28,9	1.118	93,2	1.481	60,3
Melanom	C43	22	1,8	34	2,8	56	2,3
Brust	C50	468	37,3	3	0,3	471	19,2
Prostata	C61	x	x	396	33,0	x	x
Hirntumoren	C70 -C72	75	6,0	95	7,9	170	6,9
Lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	301	24,0	265	22,1	566	23,0
standard. an Europabev. alt	C00 - C97		131,0		239,5		174,5

Datenquelle/Copyright:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Bevölkerungsstatistik, Todesursachenstatistik.

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise,

x Tabellenwert gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (K)
3.77**

**Gestorbene infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2005**

Diagnose	ICD-10	Gestorbene infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einwohner
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	3.377	265,7	4.120	340,0	7.497	302,0
darunter:							
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	450	35,4	469	38,7	919	37,0
Lunge	C33 - C34	348	27,4	1.155	95,3	1.503	60,5
Melanom	C43	45	3,5	42	3,7	87	3,5
Brust	C50	512	40,3	6	0,5	518	20,9
Prostata	C61	x	x	366	30,2	x	x
Hirntumoren	C70 - C72	74	5,8	102	8,4	176	7,1
Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe	C81 - C96	286	22,5	268	22,1	554	22,3
standard. an Europabev. alt	C00 - C97		136,5		251,7		181,4

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Todesursachenstatistik

x Tabellenwert gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (K)
3.77**

**Gestorbene infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2004**

Diagnose	ICD-10	Gestorbene infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einwohner
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	3.223	250,8	4.159	339,6	7.382	294,1
darunter:							
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	458	35,6	518	42,3	976	38,9
Lunge	C33 - C34	291	22,6	1.118	91,3	1.409	56,1
Melanom	C43	31	2,4	40	3,3	71	2,8
Brust	C50	509	39,6	5	0,4	514	20,5
Prostata	C61	x	x	361	29,5	x	x
Hirntumoren	C70 -C72	66	5,1	102	8,3	168	6,7
Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe	C81 - C96	265	20,6	321	26,2	586	23,4
standard. an Europabev. alt	C00 - C97		130,5		257,6		181,5

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Todesursachenstatistik

x Tabellenwert gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (K)
3.77**

**Gestorbene infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2003**

Diagnose	ICD-10	Gestorbene infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einwohner
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	3.229	248,5	3.979	321,9	7.208	284,3
darunter:							
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	481	37,0	469	37,9	950	37,5
Lunge	C33 - C34	282	21,7	1.094	88,5	1.376	54,3
Melanom	C43	20	1,5	44	3,6	64	2,5
Brust	C50	472	36,3	6	0,5	478	18,9
Prostata	C61	x	x	366	29,6	x	x
Hirntumoren	C70 - C72	80	6,2	114	9,2	194	7,7
Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe	C81 - C96	262	20,2	249	20,1	511	20,2
standard. an Europabev. alt	C00 - C97		133,2		256,4		181,3

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Todesursachenstatistik

x Tabellenwert gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (K)
3.77**

**Gestorbene infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2002**

Diagnose	ICD-10	Gestorbene infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einwohner
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	3.464	263,2	4.070	325,9	7.534	293,7
darunter:							
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	508	38,6	506	40,5	1.014	39,5
Lunge	C33 - C34	314	23,9	1.149	92,0	1.463	57,0
Melanom	C43	22	1,7	36	2,9	58	2,3
Brust	C50	487	37,0	2	0,2	489	19,1
Prostata	C61	x	x	343	27,5	x	x
Hirntumoren	C70 - C72	109	8,3	110	8,8	219	8,5
Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe	C81 - C96	299	22,7	282	22,6	581	22,7
standard. an Europabev. alt	C00 - C97		142,9		266,6		191,8

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Todesursachenstatistik

x Tabellenwert gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (K)
3.77**

**Gestorbene infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2001**

Diagnose	ICD-10	Gestorbene infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einwohner
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	3.443	258,0	3.901	308,7	7.344	282,6
darunter:							
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	503	37,7	476	37,7	979	37,7
Lunge	C33 - C34	298	22,3	1.095	86,6	1.393	53,6
Melanom	C43	27	2,0	33	2,6	60	2,3
Brust	C50	552	41,4	4	0,3	556	21,4
Prostata	C61	x	x	348	27,5	x	x
Hirntumoren	C70 - C72	81	6,1	89	7,0	170	6,5
Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe	C81 - C96	269	20,2	258	20,4	527	20,3
standard. an Europabev. alt	C00 - C97		144,7		262,0		189,4

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Todesursachenstatistik

x Tabellenwert gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (K)
3.77**

**Gestorbene infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 2000**

Diagnose	ICD-10	Gestorbene infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einwohner
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	3.412	252,1	3.865	302,0	7.277	276,4
darunter:							
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	498	36,8	473	37,0	971	36,9
Lunge	C33 - C34	320	23,7	1.171	91,5	1.491	56,6
Melanom	C43	31	2,3	24	1,9	55	2,1
Brust	C50	485	35,8	8	0,6	493	18,7
Prostata	C61	x	x	316	24,7	x	x
Hirntumoren	C70 - C72	107	7,9	104	8,1	211	8,0
Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe	C81 - C96	303	22,4	272	21,3	575	21,8
standard. an Europabev. alt	C00 - C97		144,0		264,3		191,0

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Todesursachenstatistik

x Tabellenwert gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (K)
3.77**

**Gestorbene infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 1999**

Diagnose	ICD-10	Gestorbene infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einwohner
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	3.324	242,8	3.818	295,1	7.142	268,2
darunter:							
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	494	36,1	464	35,9	958	36,0
Lunge	C33 - C34	272	19,9	1.094	84,6	1.366	51,3
Melanom	C43	40	2,9	31	2,4	71	2,7
Brust	C50	486	35,5	6	0,5	492	18,5
Prostata	C61	x	x	336	26,0	x	x
Hirntumoren	C70 - C72	73	5,3	83	6,4	156	5,9
Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe	C81 - C96	268	19,6	262	20,3	530	19,9
standard. an Europabev. alt	C00 - C97		142,3		268,5		190,0

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Todesursachenstatistik

x Tabellenwert gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll

**Indikator (K)
3.77**

**Gestorbene infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht,
Land Sachsen-Anhalt, 1998**

Diagnose	ICD-10	Gestorbene infolge bösartiger Neubildungen					
		weiblich		männlich		insgesamt	
		Anzahl	je 100 000 weibl. Einw.	Anzahl	je 100 000 männl. Einw.	Anzahl	je 100 000 Einwohner
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	3.470	250,8	3.774	289,0	7.244	269,3
darunter:							
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	561	40,5	424	32,5	985	36,6
Lunge	C33 - C34	289	20,9	1.196	91,6	1.485	55,2
Melanom	C43	32	2,3	30	2,3	62	2,3
Brust	C50	511	36,9	2	0,2	513	19,1
Prostata	C61	x	x	317	24,3	x	x
Hirntumoren	C70 - C72	88	6,4	82	6,3	170	6,3
Lymphat. u. blut- bildendes Gewebe	C81 - C96	247	17,9	252	19,3	499	18,6
standard. an Europabev. alt	C00 - C97		151,7		267,6		195,0

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Todesursachenstatistik

x Tabellenwert gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll