

**Indikator (L)
3.77_01**

Sterbefälle infolge von bösartigen Neubildungen der Trachea, der Bronchien und der Lunge (C33–C34) nach Geschlecht, Land Sachsen-Anhalt im Zeitvergleich

Jahr	Weiblich		Männlich		Insgesamt	
	Anzahl	je 100.000 weibl. Einw.*	Anzahl	je 100.000 männl. Einw.*	Anzahl	je 100.000 Einw.*
1998	289	13,3	1.196	81,9	1.485	40,6
1999	272	11,8	1.094	74,9	1.366	37,1
2000	320	14,1	1.172	77,4	1.492	40,0
2001	298	13,1	1.095	71,6	1.393	36,7
2002	314	13,5	1.149	72,0	1.463	37,5
2003	282	11,5	1.094	68,0	1.376	35,0
2004	291	12,6	1.118	65,7	1.409	35,0
2005	348	14,9	1.155	67,7	1.503	37,1
2006	363	16,0	1.118	64,3	1.481	36,4
2007	375	15,8	1.179	66,2	1.554	37,2
2008	376	16,2	1.109	61,1	1.485	35,4
2009	359	15,1	1.075	58,9	1.434	34,2
2010	382	16,0	1.133	60,6	1.515	35,2
2011	401	16,5	1.126	59,5	1.527	35,2
2012	405	16,8	1.089	57,5	1.494	34,7
2013	414	18,1	1.181	61,9	1.595	37,1
2014	420	16,9	1.099	56,6	1.519	34,6
2015	438	18,7	1.091	55,4	1.529	35,1
2016	440	18,9	1.028	51,2	1.468	33,0
2017	451	19,1	1.132	57,2	1.583	36,1
2018	476	20,2	1.058	51,9	1.534	34,3
2019	500	20,0	1.077	52,7	1.577	34,8

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Bundesamt: Todesursachenstatistik
gbe-bund.de (letzter Zugriff am 18.08.2021)

* standardisiert an Europabevölkerung alt