

**Indikator (L)
3.77_01**

Sterbefälle infolge von bösartigen Neubildungen der Trachea, der Bronchien und der Lunge (C33–C34) nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 2004-2023

Jahr	Weiblich		Männlich		Insgesamt	
	Anzahl	je 100.000 weibl. Einw.*	Anzahl	je 100.000 männl. Einw.*	Anzahl	je 100.000 Einw.*
2004	291	12,6	1.118	65,7	1.409	35,0
2005	348	14,9	1.155	67,7	1.503	37,1
2006	363	16,0	1.118	64,3	1.481	36,4
2007	375	15,8	1.179	66,2	1.554	37,2
2008	376	16,2	1.109	61,1	1.485	35,4
2009	359	15,1	1.075	58,9	1.434	34,2
2010	382	16,0	1.133	60,6	1.515	35,2
2011	401	16,5	1.126	59,5	1.527	35,2
2012	405	16,8	1.089	57,5	1.494	34,7
2013	414	18,1	1.181	61,9	1.595	37,1
2014	420	16,9	1.099	56,6	1.519	34,6
2015	438	18,7	1.091	55,4	1.529	35,1
2016	440	18,9	1.028	51,2	1.468	33,0
2017	451	19,1	1.132	57,2	1.583	36,1
2018	476	20,2	1.058	51,9	1.534	34,3
2019	500	20,0	1.077	52,7	1.577	34,8
2020	478	19,8	1.024	49,2	1.502	33,0
2021	535	22,7	1.019	49,0	1.554	34,4
2022	530	21,7	1.022	49,0	1.552	34,0
2023	492	19,6	1.057	50,5	1.549	33,7

Datenquelle/Copyright:
Statistisches Bundesamt: Todesursachenstatistik
gbe-bund.de (letzter Zugriff am 20.09.2024)

* standardisiert an Europabevölkerung alt