

**Indikator (L)
4.5c**

**Trends der 30-Tage-Prävalenz des Tabakkonsums nach Alter,
Sachsen-Anhalt, 1990-2021**

	18 bis 24 Jahre	25 bis 39 Jahre	40 bis 59 Jahre	60 bis 64 Jahre
Trends der 30-Tage-Prävalenz des Tabakkonsums in %				
1990	51,1	48,3	-	-
1995	~	51,5	33,0	-
1997	45,8	43,1	27,1	-
2000	40,4	44,1	22,1	-
2003	46,1	25,5	33,6	-
2006	39,9	40,2	38,0	~
2009	56,5	36,5	36,7	~
2012	25,4	35,2	34,1	11,4
2015	24,5	36,6	26,9	~
2018	20,4	33,5	21,2	~
2021	16,8	26,3	27,3	22,5
Trends der 30-Tage-Prävalenz des starken Tabakkonsums ¹ in % (Konsumierende)				
1990	13,3	39,3	-	-
1995	~	35,2	53,4	-
1997	~	26,6	38,1	-
2000	~	~	57,1	-
2003	~	~	37,9	-
2006	~	~	23,7	~
2009	~	~	~	~
2012	~	~	29,4	~
2015	~	~	~	~
2018	~	~	~	~
2021	9,7	16,9	29,8	19,0
Trends der 12-Monats-Prävalenz des problematischen Tabakkonsums nach FTND ² in %				
2000	4,7	13,0	8,7	-
2003	16,4	7,0	12,2	-
2006	11,0	9,8	9,8	~
2015	6,0	10,9	5,5	~
2021	4,9	8,8	8,5	5,5

Datenquelle/Copyright:
Institut für Therapieforschung (IFT), 2023:
Epidemiologischer Suchtsurvey 2021

- keine Daten erhoben
~ keine Berechnung aufgrund geringer Fallzahl
¹ ≥20 Zigaretten pro Tag
² Fagerström Test for Nicotine Dependence