

**Indikator (L)
4.5e**

**Trends der 30-Tage-Prävalenz des Tabakkonsums nach
Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 1995-2021**

	Männlich	Weiblich
	Trends der 30-Tage-Prävalenz des Tabakkonsums in %	
1995	52,0	34,0
1997	42,6	29,3
2000	46,0	20,6
2003	36,2	28,8
2006	46,7	31,9
2009	42,0	37,3
2012	33,4	32,6
2015	31,4	28,2
2018	32,4	16,7
2021	28,8	22,4
	Trends der 30-Tage-Prävalenz des starken Tabakkonsums ¹ in % (Konsumierende)	
1995	32,1	6,8
1997	15,5	1,9
2000	19,9	3,5
2003	15,8	4,6
2006	9,5	6,5
2009	4,4	8,1
2012	13,3	5,6
2015	7,0	2,6
2018	13,3	2,2
2021	8,0	3,8
	Trends der 12-Monats-Prävalenz des problematischen Tabakkonsums nach FTND ² in %	
2000	14,3	5,7
2003	15,3	6,6
2006	10,5	9,4
2015	12,6	2,3
2021	10,1	6,2

Datenquelle/Copyright:
Institut für Therapieforchung (IFT), 2023:
Epidemiologischer Suchtsurvey 2021

¹ ≥20 Zigaretten pro Tag

² Fagerström Test for Nicotine Dependence